

平成30年3月30日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成30年3月30日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フラスター液剤」

(農林水産省登録 第17800号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ぶどう(巨峰(露地栽培))」、「ぶどう(巨峰(施設栽培))」、「ぶどう(巨峰系4倍体品種 [巨峰を除く])」、「ぶどう(2倍体米国系品種 [デラウエアを除く])」、「ぶどう(3倍体品種) 及び「ぶどう(2倍体欧州系品種)」について、本剤の使用回数及びメピコートクロリドを含む農薬の総使用回数「1回」を「2回以内」に変更。
2. 作物名「ぶどう(ピオーネ)」及び「ぶどう(シャインマスカット)」(使用目的:着粒増加、新梢伸長抑制)を追加。
3. 作物名「ぶどう(巨峰系4倍体品種 [巨峰を除く])」を「ぶどう(巨峰系4倍体品種 [巨峰、ピオーネを除く])」に変更。
4. 作物名「ぶどう(2倍体欧州系品種)」を「ぶどう(2倍体欧州系品種 [シャインマスカットを除く])」に変更。
5. 作物名「ぶどう(2倍体米国系品種 [デラウエアを除く])」を「ぶどう(2倍体米国系品種)」に変更。
6. 「使用上の注意事項」を、以下のとおり変更。
 - ・ぶどうの品種による区分
 - ア) 2倍体米国系品種 [デラウエアを除く]
ノースレッド、ナイアガラ、スチューベン、キャンベル・アーリー、マスカットベリーA
 - イ) 2倍体欧州系品種 [シャインマスカットを除く]
甲斐路、甲斐乙女、ロザリオピアンコ、瀬戸ジャイアンツ、黄華、赤嶺
 - ウ) 3倍体品種
甲斐美嶺、サマーブラック、キングデラ、ナガノパープル
 - エ) 巨峰系4倍体品種 [巨峰、ピオーネを除く]
安芸クイーン、オリンピア、ブラックオリンピア、伊豆錦、高妻、紅伊豆、藤稔、ゴルビー

— 次ページに続く —

【 適用作物名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	使用目的	希釈倍数 (倍)	散布水量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	レコトクロリド [®] を含む農薬の 総使用回数
ぶどう (巨峰 (露地栽培))	着粒増加 新梢伸長抑制	1,000	300	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	2回以内	散布	2回以内
ぶどう (巨峰 (施設栽培))		500~ 800	100~ 150				
ぶどう (巨峰系4倍体品種) [巨峰、ピオーネを除く]							
ぶどう (2倍体米国系品種)							
ぶどう (3倍体品種)							
ぶどう (2倍体欧州系品種) [シャインスカットを除く]		1,000~ 2,000					
ぶどう (ピオーネ)	着粒増加	500~ 800	150	満開 10~40日後	2回以内	散布	2回以内
	新梢伸長抑制	500					
ぶどう (シャインスカット)	着粒増加	1,000~ 2,000	100~ 150	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	2回以内	散布	2回以内
	新梢伸長抑制	500	150				
ぶどう (テラウエア (露地栽培))	新梢伸長抑制	1,500~ 2,000	200~ 250	新梢展開葉 7~11枚時 (開花始期まで)	1回	散布	1回
ぶどう (テラウエア (施設栽培))		800~ 1,000	100~ 150				

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336