

ベトファイター[®] 顆粒水和剤

(BETOFIGHTER WDG)

登録番号 第22397号

種類名 シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤
cymoxanil・benthiavalicarb-isopropyl

性状 褐色水和性細粒

有効年限 3年

有効成分 シモキサニル 24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0%

P R T R シモキサニル(PRTR・1種) 24.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装 (100g×25袋)×4箱、500g×20袋

■特長

1. 高い予防性と残効性で、持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。
2. 高い初期感染抑制効果により、すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病徴発現前)であっても、発病を抑制できます。
3. 浸達・移行性に優れるため、植物内外で安定した防除効果が期待できます。

■適用病害名及び使用方法

(2017年1月11日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	シモキサニルを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	使用方法			
ぶどう	べと病	2,000～3,000	200～700	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	散布			
きゅうり				収穫前日まで							
すいか	褐色腐敗病	2,000	100～300	収穫3日前まで					4回以内	3回以内	5回以内
メロン	べと病			収穫14日前まで							
ねぎ	白色疫病	2,000	100～300	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3回以内				
たまねぎ	疫病			収穫14日前まで							
らっきょう	疫病	2,000～3,000	100～180	収穫前日まで	2回以内	4回以内	3回以内				
トマト	茎疫病			収穫7日前まで							
ミニトマト	べと病	1,500～2,000	100～180	収穫3日前まで	3回以内	4回以内	3回以内				
かぼちゃ	疫病			収穫10日前まで							
だいず	疫病	2,000～3,000	100～180	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	2回以内				
ばれいしょ	疫病	1,500～2,000	100～180	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	2回以内				
たばこ	疫病	2,000～3,000	100～180	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	2回以内				

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. ボルドー液等のアルカリ性農薬との混用はさけてください。
3. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。
4. 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
5. 薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
6. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意 

7. 誤飲・誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
8. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
9. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
10. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

-
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
 - 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
 - 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
 - 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。