

【適用拡大】 ぶどう/コガネムシ類成虫、小粒核果類/カイガラムシ類、うめ/ノコメトガリキリガ、びわ/カイガラムシ類
かぶ/カブラハバチ、カリフラワー/コナガ、アオムシ、花き類・観葉植物/アザミウマ類

水溶剤総合

●幅広い効果


各種作物の重要害虫に、幅広く、優れた効果を発揮します。

●浸透移行性

優れた浸透移行性により、巻葉性のアブラムシや
潜葉性のハモグリガに有効です。

●ミツバチ・マルハナバチに影響が少ない

●汚れが少ない



でっかい効果

農林水産省登録
第19112号

害虫防除の新戦略



モスピラン® 水溶剤

■適用害虫と使用方法

*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びアセタミプリドを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期*	総使用回数*	
					本剤	アセタミプリド
りんご	アブラムシ類、シンクイムシ類、キンモンホソガ、ギンモンハモグリガ、カメムシ類、リンゴワタムシ	2,000~4,000	200~700	前日	3回	3回
	カイガラムシ類、モモチョッキリゾウムシ	4,000				
	ケムシ類	2,000				
ななし	アブラムシ類、シンクイムシ類、カキノヒメヨコバイ、カイガラムシ類、カメムシ類	2,000~4,000	200~700	14日	3回	3回
	カイガラムシ類、アザミウマ類、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類成虫	2,000~4,000				
	ツマグラオオカスミカメ	2,000				
ぶどう	フトウラクミキリ	2,000	200~700	収穫後秋期	3回	3回
	オウトウショウジョウバエ、カメムシ類	2,000~4,000				
	アザミウマ類	4,000				
おうとう	コスカシバ	2,000	200~700	3日	1回	1回
	アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、アザミウマ類、カメムシ類	2,000~4,000				
	シンクイムシ類	4,000				
ネクターリン	カイガラムシ類	2,000	200~700	前日	3回	3回
	アブラムシ類	2,000~4,000				
	アブラムシ類	4,000				
すもも	アブラムシ類	2,000~4,000	200~700	7日	2回	2回
	カイガラムシ類	2,000				
	アブラムシ類	2,000~6,000				
小粒核果類 (すもも、うめを除く)	ケシキスイ類、ノコメトガリキリガ、カイガラムシ類	2,000	200~700	前日	3回	3回
	アブラムシ類、カミキリムシ類	2,000~4,000				
	カイガラムシ類	2,000				
うめ	アザミウマ類、キボシカミキリ、カイガラムシ類、イチジクヒトリモドキ	2,000	200~700	35日	3回	3回
	アザミウマ類	2,000				
	アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、カメムシ類	2,000~4,000				
いちじく	アブラムシ類、ゴマダラカミキリ成虫、カイガラムシ類、ミカンハモグリガ	2,000~4,000	200~700	14日	2回	2回
	アザミウマ類、アザミウマ類	4,000				
	アザミウマ類、アザミウマ類	4,000				
マンゴー	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	前日	2回	2回
	アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、カメムシ類	2,000~4,000				
	アブラムシ類、ゴマダラカミキリ成虫、カイガラムシ類、ミカンハモグリガ	2,000~4,000				
かんきつ	ミカンハエ、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、アゲハ類、カメムシ類、アザミウマ類	2,000~4,000	200~700	7日	1回	1回
	コナジラミ類	4,000				
	ゴマダラカミキリ※1	200~400				
キウイフルーツ	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	45日	6回	6回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
かりん	アブラムシ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
アセロラ	アブラムシ類	4,000	200~700	7日	6回	6回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
パッションフルーツ	アブラムシ類	4,000	200~700	7日	6回	6回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
あけび(果実)	アブラムシ類	4,000	200~700	7日	6回	6回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
ブルーベリー	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(果実)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日	1回	1回
	アブラムシ類	4,000				
	アブラムシ類	4,000				
さんしょう(葉)	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	200~700	7日		

適用害虫と使用方法

*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びアセタミプリドを含む農薬の総使用回数（回）の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期*	本剤	総使用回数*	
						アセタミプリド	アセタミプリド
キャベツ	アブラムシ類	2,000~4,000	100~300	7日	5回	6回	（粒剤の株元散布及び土壌混和は合計1回、散布は5回）
	コナガ、アオムシ	1,000~2,000					
はくさい	アブラムシ類	2,000~4,000	14日	3回	4回	（粒剤の株元散布及び土壌混和は合計1回、散布は3回）	
ブロッコリー カリフラワー	コナガ、アオムシ、アブラムシ類	2,000	7日	1回	2回	3回	
レタス	アブラムシ類	4,000				4回（粒剤の株元散布は1回、散布は3回）	
非結球レタス	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	7日	1回	2回	2回（粒剤の株元散布は1回、散布は1回）	
くきちしゃ	アブラムシ類						
だいこん	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	2,000	14日	7日	1回	1回	
はつかだいこん	アブラムシ類	2,000~4,000					
わさびだいこん	コナガ	2,000	7日	1回	1回	1回	
かぶ	アブラムシ類、キスジノミハムシ						
キャベツ	アブラムシ類	4,000	7日	1回	1回	チンゲンサイは2回 （粒剤の株元散布は1回、散布は1回） チンゲンサイ以外は1回	
非結球菜	アブラムシ類、キスジノミハムシ						
なばな類	アブラムシ類	4,000~8,000	14日	3回	2回	1回	
つるな						3回	
蓬	アブラムシ類	4,000	前日	2回	2回	2回	
メキャベツ	アブラムシ類	2,000	7日	1回	1回	1回	
非結球メキャベツ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000~4,000	7日	2回	2回	2回	
ふだんそう、エンサイ	アブラムシ類						
しそ	アブラムシ類	4,000	14日	7日	1回	1回	
タラゴン	アブラムシ類	8,000					
ほうれんそう	アブラムシ類	8,000	7日	3日	1回	1回	
しゅんぎく							
なすな、ははこくさ	アブラムシ類	4,000~8,000	21日	14日	3回	3回	
パセリ							
タイム、バジル	アブラムシ類	8,000	7日	前日	3日	3回	
チャービル、ディル(葉)							
セージ	アブラムシ類	4,000	7日	前日	3日	3回	
レモンバーム							
マジョラム	アブラムシ類	8,000	7日	前日	3日	3回	
はっか、オレガノ							
にがうり	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000~4,000	7日	前日	3日	3回	
うり類(漬物用)	アブラムシ類	8,000					
メロン	アブラムシ類	2,000	前日	2回	3回	3回 （は種時または定植時の土壌混和は合計1回、散布は2回）	
かぼちや	アブラムシ類	2,000					
きゅうり	コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ	2,000~4,000	3日	3回	4回	4回 （定植時の土壌混和は1回、散布及びくん煙は合計3回）	
	ウリノメイガ						
すいか	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	前日	2回	3回	3回 （粒剤の定植時までの処理は1回、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回）	
	ウリノメイガ、コナジラミ類						
なす	アブラムシ類	2,000~4,000	7日	前日	4回	4回 （粒剤の定植時までの処理は1回、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回）	
	コナジラミ類						
ピーマン	アブラムシ類	4,000	7日	前日	4回	4回 （粒剤の定植時までの処理は1回、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回）	
	アザミウマ類						
とうがらし類	アブラムシ類	8,000	7日	前日	4回	4回 （粒剤の定植時までの処理は1回、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回）	
トマト	アブラムシ類、コナジラミ類	2,000					
ミニトマト	アザミウマ類	4,000	14日	3回	3回	3回 （は種時の土壌混和は1回、植付時の土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回）	
オクラ	アブラムシ類	2,000					
にら	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000	7日	3回	4回	4回 （土壌混和は1回、散布は3回）	
らっきょう	アザミウマ類	2,000					
たまねぎ	アブラムシ類	8,000	7日	2回	2回	2回 （定植時の土壌混和は1回）	
ねぎ	アブラムシ類	4,000					
わけぎ、あざつき	アブラムシ類	2,000	前日	2回	3回	3回 （粒剤の株元散布及び土壌混和は合計1回、散布及びくん煙は合計2回）	
みつば	アブラムシ類	2,000~4,000					
セルリー	コナジラミ類	2,000~4,000	7日	3回	4回	4回 （植付時の土壌混和は1回、植付後は3回）	
モロヘイヤ	アブラムシ類	2,000					
いちご	コナジラミ類、アザミウマ類	2,000~4,000	7日	3回	3回	3回	
	アブラムシ類						
ばれいしょ	アブラムシ類	2,000~6,000	21日	5回	5回	5回	
やまのいも	アブラムシ類、アザミウマ類	4,000					
やまのいも(むかご)	アブラムシ類	4,000	14日	前日	3回	3回	
やまのいも(種芋栽培)	アブラムシ類	2,000~4,000					
あずき	アブラムシ類	2,000~4,000	7日	3回	4回	4回 （は種時または定植時の土壌混和は合計1回、散布は3回）	
とうもろこし(未成熟とうもろこしを除く)	アブラムシ類	4,000					
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類	4,000	前日	2回	2回	2回	
アスパラガス	アザミウマ類						
えだまめ	アブラムシ類	2,000~4,000	前日	2回	2回	2回	
さやえんどう	アブラムシ類	2,000					
さやいんげん	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	4,000	14日	3日	1回	1回	
ヤングコーン	アブラムシ類	3,000					
ふき	アブラムシ類	8,000	3日	1回	1回	1回	

*4 みつばの収穫7日前まで、ただし伏せ込み栽培は伏せ込み前まで



アセタミプリド...20.0% 人畜毒性:医薬用外劇物

効果・薬害等の注意

- はくさいに使用する場合、幼苗期には薬害を生じるおそれがあるので、活着後に使用してください。
- きゅうりに使用する場合、幼苗・軟弱徒長苗など、および高温・多湿時には葉縁に薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- メロン・うり科作物には葉縁に薬害を生じるおそれがあるので、使用濃度・使用量を厳守し、幼苗期や高温時の使用をさけてください。
- なしに使用する場合、品種によって葉裏に黒色斑点の薬害を生じることがありますので、下表を参考に使用してください。

薬害の認められない品種
二十世紀、ゴールド二十世紀、幸水、新水、豊水、新興、新星、晩三吉、愛宕、新雪、今村秋、新世紀、豊月、ラフランス、ルレクチェ、ヤーリー
薬害を生じることのある品種(使用をさけてください)
新高、長十郎、八雲、愛甘水

- ぶどうの幼果期から果粒肥大期の散布は、果粉の溶脱のおそれがあるので使用はさげ、新梢伸長期から落花期および袋かけ以降に使用してください。
- ももの施設栽培では、葉に薬害を生じるおそれがあるので、使用はさけてください。
- 花き・花木に使用する場合、品種によって薬害を生じるおそれがあるので、あらかじめ、小規模散布などで薬害の有無を確認してから、ご使用ください。
- かんきつに希釈倍数200~400倍で使用する場合、薬液が葉にかかると薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
- マメコバチに対して影響があるので、授粉のためにマメコバチを使用する場合は、開花期に本剤を使用しないでください。
- 蜜に対しては長期間毒性があるので、近くに養蜂場のある場合には絶対に養蜂場にかからないようにしてください。
- 散布量は、対象作物の生育段階・栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。
- 使用方法などを厳守してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取り扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。(刺激性)
- 使用の際は、防護マスク・手袋・不浸透性防護衣などを着用してください。作業後は直ちに手足・顔等を石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔し、衣服を交換してください。
- 本剤の中毒に対しては、動物実験でL-メチオニン製剤・グリチルリチン製剤およびグルタチオン製剤の注射投与が有効であると報告もあります。
- 街路・公園等で使用する場合は、使用中および使用後(少なくとも使用当日)に、小児や、使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう、縄囲いや、立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 保管: 密封し、直射日光を避け、食品と区別して小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は警察に届け出てください。

注意

コナガ・アブラムシは抵抗性が発達しやすいので、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用し、連続散布はさけてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空袋・空容器等は圃場等に放置せず、適切に処理してください。

本資料は2011年8月現在の登録内容に基づいています。