

平成24年 3月 21日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年3月21日付で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ダイパワー水和剤」

(農林水産省登録 第20237号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「ぶどう」(適用病害名:べと病、黒とう病、晩腐病)を追加。
- 作物名「たまねぎ」(適用病害名:灰色かび病)を追加。
- 作物名「なし」の適用病害名に「黒斑病」及び「炭疽病」を追加。
- 作物名「きゅうり」の適用病害名に「炭疽病」を追加。
- 「使用上の注意事項」を、次のとおり追加、変更。
 - 「ぶどうに使用する場合、幼果期～袋掛けまでの散布は、果粉の溶脱や果実の汚染を生じる恐れがあるので注意すること。」を追加。
 - 「ももでは、発芽後の若葉には薬害を生じる恐れがあるので必ず発芽前に散布すること。」を追加。
 - 「石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油剤、カゼイン石灰との混用は避けること。」の注意事項から「カゼイン石灰」の記載部分を削除。
 - 「西洋なしの品種ル・レクチャーではさび果、ももの缶桃14号等の～」の注意事項について「ル・レクチャー」を「ル レクチエ」に変更。

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミカジンを含む農薬の総使用回数	キャブタンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	べと病 黒とう病 晩腐病		200~700	収穫60日前まで	2回以内		3回以内 (休眠期は1回以内、 生育期は2回以内)	2回以内
たまねぎ	灰色かび病	1,000	150~300	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内	6回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は5回以内)

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240321-2 ダイパワー水和剤

作物名	適用病害名	希釈 倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ミクダジンを含む 農薬の総使用回数	キャプタンを含む 農薬の総使用回数
なし	輪紋病 黒星病 うどんこ病 黒斑病 炭疽病	1,000	200~700	収穫 14 日 前まで	4 回以内	散布	5 回以内 (塗布剤は 2 回以内、 液剤は 1 回以内)	9 回以内
きゅうり	褐斑病 炭疽病		150~300	収穫前日 まで	5 回以内		5 回以内	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内)

以 上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336