

平成24年8月8日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年8月8日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「モスピラン粒剤」

(農林水産省登録 第19114号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「いちご」に、適用害虫名「コガネムシ類幼虫」を追加。
2. 作物名「すいか」の「アセミプリド」を含む農薬の総使用回数を、「4回以内(定植時の土壤混和は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)」に変更。
3. 作物名「非結球レタス」に、適用害虫名「ヨトウムシ」を追加。
4. 作物名「キャベツ」の「アセミプリド」を含む農薬の総使用回数を、「6回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)」に変更。
5. 作物名「はくさい」及び「ブロッコリー」の「アセミプリド」を含む農薬の総使用回数を、「4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)」に変更。
6. 作物名「かぼちゃ」の「アセミプリド」を含む農薬の総使用回数を、「3回以内(は種時または定植時の土壤混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更。

【 適用害虫名と使用方法 】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類	0.5g/株	定植時	1回	株元散布	3回以内 (粒剤の株元散布及び土壤混和は合計1回以内、散布及びくん煙は合計2回以内)
		0.5~1g/株	生育期(定植30日後まで) 但し、マルチ被覆直前まで			
	コナジラミ類 コガネムシ類幼虫	1g/株	定植時		植穴土壤混和	

— 次ページに続く —

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセチリドを含む農薬の総使用回数
すいか	アブラムシ類	1g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)
非結球レタス		0.25~0.5g/株	定植前日~定植当日		株元散布	2回以内 (粒剤の株元散布は1回以内、散布は1回以内)
	ナメグリハエ オオタバコガ ヨトウムシ	0.5g/株			植穴土壌混和	6回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)
キャベツ	コナガ、アオムシ、	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	6回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)
	アブラムシ類	0.5~1g/株	定植前日~定植当日		株元散布	
	ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ	0.5g/株			植穴土壌混和	
	アブラムシ類	1g/株 1~2g/株	定植時		株元散布	
はくさい	ハイマダラノメイガ	0.5g/株	定植前日~定植当日		株元散布	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
	コナガ、アオムシ、 アブラムシ類		定植時		植穴土壌混和	
ブロッコリー	コナガ	0.5~1g/株	定植前日~定植当日		株元散布	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
		1~2g/株	定植時	植穴土壌混和		
	アオムシ アブラムシ類	1g/株 0.5~1g/株	定植前日~定植当日	株元散布		
	ハイマダラノメイガ	0.5g/株		植穴土壌混和		
かぼちゃ	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和	3回以内 (は種時または定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	
は種時	播溝土壌混和					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336