

平成24年9月12日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年9月12日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「小麦」の適用病害虫名「雪腐小粒菌核病」の、希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更。
2. 作物名「いんげんまめ」(適用病害虫名：炭疽病、灰色かび病、菌核病)を追加。
3. 作物名「はくさい」「キャベツ」「ブロッコリー」「カリフラワー」「レタス」「非結球レタス」「ばれいしょ」について、使用方法「全面散布後土壌混和」を「全面散布土壌混和」に変更。
4. 「使用上の注意事項」について、以下を変更。
 - ・全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和すること。降雨直後の処理は、混和むらの原因となるので避けること。

【 適用病害虫名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを 含む農薬の 総使用回数
小麦	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病	1,000	60～150 L/10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (は種前は1回 以内、は種後は 2回以内)
	雪腐小粒菌核病	1,000～ 2,000					
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病	1,000～ 2,000	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内		3回以内
	菌核病	1,000					

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240912-2 日曹フロンサイドSC

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
はくさい	根こぶ病	500 mL/10a	100~150 L/10a	定植前	1回	全面散布 土壌混和	1回
キャベツ				は種又は定植前	2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)		2回以内 (苗床では1回以内、本圃では1回以内)
ブロッコリー カリフラワー				定植前	1回		1回
レタス 非結球レタス	すそ枯病						
ばれいしょ	粉状そうか病	600 mL/10a	100 L/10a	植付前			6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336