

平成24年9月12日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年9月12日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「モスピラン水溶剤」

(農林水産省登録 第19112号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ゴレンシ」(適用害虫名：カガラムシ類)を追加。
2. 作物名「たらのき」(適用害虫名：センノガサ)を追加。
3. 作物名「キャベツ」に、希釈倍数を「2000～4000倍」とする適用害虫名「アザミウマ類」を追加。
4. 作物名「レタス」、「非結球レタス」に、適用害虫名「ナモグリバエ」を追加。
5. 作物名「はくさい」に、適用害虫名「カブラハバチ」を追加。
6. 作物名「チンゲンサイ」(適用害虫名：アブラムシ類、キジノミムシ、カブラハバチ)を追加。
7. 作物名「非結球あぶらな科葉菜類」について、次のとおり変更。
 - ① 作物名を「非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)」に変更。
 - ② アセタミプリドを含む農薬の総使用回数を「チンゲンサイは2回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布は1回以内)、チンゲンサイ以外は1回」を「1回」に変更。
8. 作物名「だいこん」の適用害虫名「カブラハバチ」の希釈倍数を「4000倍」から「2000～4000倍」に変更。
9. 作物名「きゅうり」について、次のとおり変更。
 - ① 適用害虫名「ウリハムシ」(希釈倍数：4000倍)を追加。
 - ② 適用害虫名「ミナミキイロアザミウマ」及び「ミカンキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更し、希釈倍数を「2000～4000倍」とする。
10. 作物名「すいか」に、適用害虫名「ウリハムシ」(希釈倍数：4000倍)を追加。
11. 作物名「かぼちゃ」に、適用害虫名「ウリハムシ」(希釈倍数：4000倍)及び、「カボチャミバエ」(希釈倍数：2000倍)を追加。
12. 作物名「なす」に、適用害虫名「テントウムシダマシ類」を追加。
13. 作物名「ばれいしょ」に、適用害虫名「ジャガイモガ」を追加。
14. 作物名「もも」、「おうとう」、「マンゴー」に、適用害虫名「カイガラムシ類」を追加。
15. 作物名「ぶどう」に、適用害虫名「トビイロトラガ」を追加。

— 次ページに続く —

【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセチプロトを含む 農薬の総使用回数
ゴレンシ	カイラムシ類	4,000	200~700	収穫 21 日前 まで	3 回以内		3 回以内
たらのぎ	センノミドリ	2,000		収穫 45 日前 まで			
キャベツ	コガ、アオムシ	1,000~ 2,000	100~300	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	6 回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計 5 回以内)
		アブラムシ類 アザミウマ類					
レタス	アブラムシ類 ナメクジバエ	4,000					
非結球レタス	アザミウマ類	4,000		1 回	2 回以内 (粒剤の株元散布は 1 回以内、散布 1 回以内)		
はくさい	コガ、アオムシ	1,000~ 2,000		収穫 14 日前 まで	3 回以内		4 回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計 3 回以内)
	アブラムシ類	2,000~ 4,000					
	カブラバチ	4,000					
非結球あぶらな 科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キジノミハムシ	4,000		収穫 7 日前 まで	1 回		1 回
チンゲンサイ	カブラバチ						
だいこん	コガ、アオムシ キジノミハムシ ダイコンカハムシ	2,000		収穫 14 日前 まで			1 回
	アブラムシ類 カブラバチ	2,000~ 4,000					
きゅうり	コナジラミ類 ウリノメガ	2,000	収穫前日 まで	3 回以内	5 回以内 (2%粒剤の定植時の株元散布 は 1 回以内、2%粒剤の定植後 の株元散布は 1 回以内、散布 及び 1%粒剤の株元散布は合計 3 回以内)		
	アブラムシ類 アザミウマ類	2,000~ 4,000					
	ウリハムシ	4,000					
すいか	コナジラミ類 ウリノメガ	2,000	収穫 3 日前 まで		4 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回 以内、散布、くん煙及び 定植後の株元散布は合計 3 回以内)		
	アブラムシ類 アザミウマ類	2,000~ 4,000					

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240912-3 モスピラン水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用用量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセチプロトを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	アブラムシ類	2,000～4,000	100～300	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布 は合計2回以内)
	カボチャミバエ	2,000					
	ウリハムシ	4,000					
なす	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	4,000		収穫7日前まで	3回以内		4回以内 (粒剤の定植時までの処理 は1回以内、散布、くん煙 及び定植後の株元散布合計 3回以内)
	コナジラミ類	2,000					
	アザミウマ類	2,000～4,000					
ばれいしょ	シヤカイモガ	2,000		収穫前日まで	3回以内		4回以内 (植付時の土壌混和は は1回以内、植付後は 3回以内)
	テントウムシダマシ類	2,000～4,000					
	アブラムシ類	2,000～6,000					
もも	アブラムシ類 モモハモガリガ シクイムシ類 アザミウマ類 カメムシ類	2,000～4,000		収穫前日まで	3回以内		3回以内
	コスガハ	2,000					
	カイガラムシ類						
おうとう	カメムシ類 オウトウショウジョウバエ	2,000～4,000	200～700	収穫3日前まで	1回	1回	
	アザミウマ類	4,000					
	ぶどう	カイガラムシ類 アザミウマ類 フタテンヒメコバエ コガネムシ類成虫					2,000～4,000
ツマクロアカスミカメ ヒトリノコ		2,000					
ブドウトラカミキリ							
マンゴー	アザミウマ類 カイガラムシ類			収穫35日前まで			

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336