

平成26年6月11日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成26年6月11日付で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベフラン液剤25」

(農林水産省登録 第21467号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「小麦」の適用病害名「紅色雪腐病」(使用方法:「散布」)について、希釈倍数「250倍」を追加し、使用液量「25L/10a」、使用時期「根雪前」とする。
2. 「使用上の注意事項」について、以下を追加する。
 - ・ 本剤を小麦に対して希釈倍数250倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を用いて均一に散布すること。
 - ・ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
3. 「使用上の注意事項」について、以下を変更する。(変更箇所:下線部)
 - ・ 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

— 次ページに続く —

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミクダジンを 含む農薬の 総使用回数
小麦	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1,000倍	60~150 L/10a	根雪前	3回以内 (但し、 出穂期以降 は1回以内)	散布	4回以内 (種子への処理 は1回以内、 散布及び無人 ヘリ散布は合計 3回以内、 出穂期以降は 1回以内)
	うどんこ病			収穫14日 前まで			
	赤かび病	1,000~ 2,000倍					
	紅色雪腐病	250倍	25 L/10a	根雪前	1回	塗沫処理	
		10倍	乾燥種子 1kg 当り 30~50mL	は種前			
		5倍	乾燥種子 1kg 当り 15~25mL				
		原液	乾燥種子 1kg 当り 3~5mL				
条斑病 ふ枯病	原液	乾燥種子 1kg 当り 3~5mL	種子吹き付 け処理又は 塗沫処理				
なまぐさ黒穂病	1,000~ 2,000倍	—	—	—	10~30分間 種子浸漬		

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336