

平成28年10月19日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成28年10月19日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「アタッキン水和剤」

(農林水産省登録 第13833号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「キャベツ」(適用病害名:菌核病)を追加。
2. 作物名「ばれいしょ」について、以下のとおり変更。
 - ① 適用病害名「黒あざ病」及び「黒あし病」の使用量「5~10秒間種いも浸漬、又は種いも100kg当り2.5~3Lを散布」を「5~10秒間種いも浸漬」及び「種いも散布」に変更。
 - ② 使用方法「5~10秒間種いも浸漬」の使用量を「一」とし、使用方法「種いも散布」の使用量を「種いも100kg当り2.5~3L」として追加。
3. 作物名「こんにゃく」について、以下のとおり変更。
 - ① 使用方法「平置きした種いもに1㎡当り150mlを散布」を「種いも散布」に変更。
 - ② 使用方法「1時間種いも浸漬」の使用量を「一」とし、使用方法「種いも散布」の使用量を「平置きした種いも1㎡当り150ml」として追加。
4. 作物名「もも」及び「うめ」に、使用量「200~700L/10a」を追加。
5. 作物名「はくさい」及び「たまねぎ」に、使用量「100~300L/10a」を追加。
6. 作物名「チューリップ」に、使用量「一」を追加。
7. 「使用上の注意事項」に、以下の項目を追加。
 - ・キャベツに対しては、薬害を生じやすいので、高温条件下での連続散布はさけること。

— 次ページに続く —

【 適用病害名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
もも	せん孔細菌病 黒星病	1,000倍	200~700 L/10a	収穫 60 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内	10 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回以内、 生育期の散布は 6 回以内)
うめ	かいよう病 黒星病	800~ 1,000倍		収穫 90 日 前まで				6 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 3 回以内)
キャベツ	菌核病	1,500倍		収穫 14 日 前まで				3 回以内 (種子への処理は 1 回以内、は種後は 2 回以内)
はくさい	軟腐病 白斑病	1,000倍						
たまねぎ	軟腐病 灰色腐敗病	800倍	100~300 L/10a	収穫 7 日 前まで	5 回以内		5 回以内	7 回以内 (種子への処理は 1 回以内、 苗根部浸漬は 1 回以内、 無人へ散布は 3 回以内、 散布は 5 回以内)
ばれいしょ	黒あざ病 黒あし病	40倍	— 種いも 100kg 当り 2.5~3L	植付前	1 回	5~10 秒間 種いも浸漬	5 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内)	5 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内)
	そうか病	40~60倍				5~10 秒間 種いも浸漬		
こんにゃく	乾腐病 腐敗病	1,000倍	—	貯蔵前 又は 植付前	1 時間 種いも浸漬	6 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内)	1 回	
		30倍	平置きした 種いも 1 m ² 当り 150ml	植付前	種いも散布			
チューリップ	球根腐敗病 かいよう病	球根重量 の 0.2~ 0.5%	—	貯蔵前 又は 植付前		球根粉衣	1 回	5 回以内

以 上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336