

平成30年8月8日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成30年8月8日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「バスアミド微粒剤」

(農林水産省登録 第23478号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「非結球メキャベツ」を追加。
2. 作物名「豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く)」を「豆類 (未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)」へ変更。作物名「未成熟そらまめ」を使用時期「は種 21 日前又は定植 45 日前まで」として追加。
3. 作物名「未成熟そらまめ」に適用病害名「えそモザイク病」を追加。
4. 作物名「しそ」の使用時期「は種 14 日前まで」を「は種 14 日前又は定植 21 日前まで」に変更。
5. 作物名「ほうれんそう」の使用時期「は種 10 日前まで (地温 20℃以上)」に適用害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」を追加し、使用時期を「は種 10 日前まで」に変更。
6. 作物名「にんじん」に適用病害名「乾腐病」を追加。
7. 作物名「きゅうり」「メロン」「すいか」「トマト」「ミニトマト」「なす」「ピーマン」「たまねぎ」「にんにく」「にら」「にんじん」「レタス」「非結球レタス」「食用ぎく」「ふき」「さやいんげん」「えだまめ」「かんしょ」に適用病害名「白絹病」を追加。
8. 作物名「あしたば」「みつば」「つるむらさき」「モロヘイヤ」も適用雑草名「一年生雑草」を追加。

— 次ページに続く —

【適用病害虫名及び適用雑草名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害虫名及び適用雑草名	使用量	使用時期	本剤及びダゾメトを含む農薬の総使用回数	使用方法
非結球 メキャベツ	萎黄病、一年生雑草	20~30 kg/10a	定植 21 日前 まで	1 回	本剤の所定量を均一に 散布して土壌と混和する。
きゅうり	苗立枯病(ヒトシム菌)	200~400 g/m ³	は種又は定植 21 日前 まで		土壌に本剤の所定量を 加え十分混和する。
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	20~30 kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する。
メロン	つる割病、半身萎凋病 白絹病 、一年生雑草	20~30 kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する。
	黒点根腐病、つる割病 半身萎凋病、黒変根腐症 白絹病 、一年生雑草	20~30 kg/10a			土壌に本剤の所定量を 加え十分混和する。
	紅色根腐病	30kg/10			本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する。
すいか	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200~400 g/m ³			土壌に本剤の所定量を 加え十分混和する。
	つる割病、 白絹病 一年生雑草	20~30 kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する。
トマト ミニトマト	苗立枯病(リゾクトニア菌)	200~300 g/m ³			土壌に本剤の所定量を加え 十分混和する。
	萎凋病、褐色根腐病 根腐萎凋病、半身萎凋病 白絹病 、ネコブセンチュウ 一年生雑草	20~30 kg/10a			本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する
	紅色根腐病	30kg/10a			
	青枯病	30~60 kg/10a			
なす	苗立枯病(リゾクトニア菌)	20~30 kg/10a			
	半身萎凋病、 白絹病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20~30 kg/10a			
ピーマン	苗立枯病(リゾクトニア菌) 半身萎凋病、萎凋病 青枯病、 白絹病 一年生雑草	30kg/10a			
たまねぎ	黒腐菌核病	30~60 kg/10a			
	紅色根腐病	30kg/10a			
	乾腐病、 白絹病 ネコブセンチュウ、一年生雑草	20~30 kg/10a	は種 14 日前 まで		
	苗立枯病	20~40 kg/10a			
	黒穂病、一年生雑草	20~30 kg/10a			
	一年生雑草	10~20 kg/10a			
にんにく	紅色根腐病、 白絹病 イモガサセンチュウ、一年生雑草	30kg/10a	植付 28 日前 まで		
にら	乾腐病、紅色根腐病 白絹病 、一年生雑草	30kg/10a	は種又は定植 21 日前まで		

日曹農薬登録速報 H300808-3 バスアミド微粒剤

作物名	適用病害虫名及び 適用雑草名	使用量	使用時期	本剤及びタゾメ トを含む農業の 総使用回数	使用方法
にんじん	萎凋病、根腐病、しみ腐病、 乾腐病 、 白絹病 ネゴセンチュウ、一年生雑草	20~30 kg/10a	は種又は定植 21 日前まで	1 回	本剤の所定量を均一に散布して 土壌と混和する。
あしたば	苗立枯病(リゾクトニア菌) 一年生雑草	30kg/10a	は種 10 日前 まで		
レタス	すそ枯病、 白絹病 一年生雑草	20~30 kg/10a	は種又は定植 14 日前まで		
	ネガサセンチュウ	30kg/10a			
非結球レタス	すそ枯病、根腐病 白絹病 、一年生雑草	20~30 kg/10a			
食用ぎく	センチュウ類(ハカレセンチュウを除く)、萎凋病、半身萎凋病 白絹病 、一年生雑草	20~30 kg/10a	は種又は定植 21 日前まで		
	青枯病				
ふき	半身萎凋病、 白絹病 一年生雑草	30kg/10a			
みつば	立枯病、 一年生雑草	20kg/10a			
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病、一年生雑草	30kg/10a	は種 21 日前 まで		
さやいんげん	苗立枯病(リゾクトニア菌) 葉腐病、 白絹病 一年生雑草	20~30 kg/10a	は種又は定植 21 日前まで		
えだまめ	ダイズシセンチュウ	30kg/10a			
未成熟そらまめ	苗立枯病(リゾクトニア菌) 茎腐病、 えそモザイク病 一年生雑草	30kg/10a	は種 21 日前又は 定植 45 日前 まで		
かんしょ	紫紋羽病、つる割病 白絹病 、ネゴセンチュウ 一年生雑草		植付 21 日前 まで		
ほうれんそう	ナリンウケガコダニ 立枯病、萎凋病、株腐病 根腐病、一年生雑草	20~30 kg/10a	は種 10 日前 まで		
つるむらさ	ネゴセンチュウ、 一年生雑草		定植 21 日前 まで		
しそ	青枯病 一年生雑草	30kg/10a	は種 14 日前又は 定植 21 日前 まで		
モロヘイヤ	ネゴセンチュウ、 一年生雑草	30kg/10a	定植 30 日前 まで		

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336