

2019年9月25日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2019年9月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベリマークSC」

(農林水産省登録 第24090号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ブロッコリー」に適用害虫名「ハイマダラノメイガ」を追加。
2. 作物名「レタス」及び「非結球レタス」に適用害虫名「ウワバ類」を追加。
3. 作物名「非結球レタス」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内）」に変更。
4. 作物名「いちご」に適用害虫名「アザミウマ類」を追加。
5. 作物名「きゅうり」の適用害虫名「アブラムシ類」の希釈水量「400株当たり10～20L（1株当たり25～50mL）」を「400株当たり2～20L（1株当たり5～50mL）」に変更。
6. 作物名「ねぎ」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数について、「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内）」を「4回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内（但し、株元灌注は1回以内）」に変更。
7. 作物名「ししとう」を追加。
8. 作物名「非結球あぶらな科葉菜類」を追加。

— 次ページに続く —

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリニフ® ロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ 社リムシ類 ウバ類	400	セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の 散布は3回 以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラバチ						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ						
レタス	オタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ						
非結球 レタス	アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ ウバ類						
カリフラワー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	2,000	0.5L/m ²	収穫7日前 まで	株元 灌注	1回	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の処 理は3回以内 (但し、株元灌 注は1回以内))
ねぎ	シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類						
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロサノメイガ						
いちご	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類	1,000	50mL/株	育苗期後半 ~定植当日	灌注	4回以内 (灌注は1回以 内、散布は 3回以内)	
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ アブラムシ類	4,000	0.2L/m ²	収穫7日前 まで	株元 灌注	1回	

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 190925-2 ベリマークSC

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントリプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
きゅうり	アブラムシ類	400株当り 25mL	400株当り 2~20L (1株当り 5~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類						
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類						
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
ししとう	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	400株当り 10L (1株当り 25mL)				4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336