

2020年4月22日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2020年4月22日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

### 【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「小麦」に適用病害名「なまぐさ黒穂病」を追加。
2. 作物名「キャベツ」の使用方法「全面土壌散布」に、適用病害名「株腐病」を追加。

- 次ページに続く -

【 適用病害名と使用方法 】

( **枠線太字**が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病 <b>なまぐさ黒穂病</b>	1,000	60~150	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (は種前は1回以内、 は種後は2回以内)
	雪腐小粒菌核病	1,000~ 2,000					
		250	25				

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
		薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)				
キャベツ	苗立枯病 (リゾフチニア菌) 菌核病 根こぶ病	500	100~200	は種 又は 定植前	2回以内 (苗床では 1回以内、 本圃では 1回以内)	全面散布 土壌混和	3回以内 (苗床では1回以内、 本圃での土壌混和は1回以内、 土壌散布は1回以内)
	定植前			1回			
	<b>株腐病</b>		<b>150~200</b>				
小麦	縞萎縮病	600	100	は種前	1回	全面散布 土壌混和	3回以内 (は種前は1回以内、 は種後は2回以内)
	<b>なまぐさ黒穂病</b>	<b>500</b>					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336