

2021年4月21日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2021年4月21日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ビーナイン顆粒水溶剤」

(農林水産省登録 第22759号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「シクラメン（施設栽培）」を追加。
2. 作物名「ハイドラングア（施設栽培）」に使用時期「育苗期摘芯後10~30日」を追加。
3. 作物名「しゃくなげ（施設栽培）」の使用時期を「新梢伸長完了期を1回目として3回処理(1カ月間隔)」に変更。
4. 作物名「ハイドラングア（施設栽培）」のダミノジッドを含む農薬の総使用回数を「4回以内(育苗期は2回以内、定植後は2回以内)」に変更。
5. 「使用上の注意事項」について以下のとおり追加。
(8)シクラメンについて以下のことを注意すること。
 - ① 複数回処理する場合は、必ず花芽揃期に1回散布し、散布間隔を1カ月程度空けること。
 - ② 花梗再伸長時の処理では、花卉の小型化や開花の遅延などの薬害が生じるおそれがあるので注意すること。

— 次ページに続く —

【適用作物名及び使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	使用目的	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ダミゾットを 含む農薬の 総使用回数
ハイドランジア (施設栽培)	節間の 伸長抑制	100~200	50~150L/10a	育苗期摘芯後 10~30日	2回以内	茎葉 散布	4回以内 (育苗期は 2回以内、 定植後は 2回以内)
				定植後 3~30日			3回以内
シクラメン (施設栽培)	花梗、葉柄の 伸長抑制	300	7mL/4号鉢	花芽揃期	1回		3回以内
				花梗再伸長時	2回以内		
しゃくなげ (施設栽培)	節間の 伸長抑制、 着蕾数増加	75~100	100mL/5号鉢	新梢伸長完了期を 1回目として3回処理 (1ヵ月間隔)	3回		3回

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336