

エキナイン[®] 顆粒水和剤

(EKININE WDG)

登録番号 第21991号

種類名 シモキサニル・ベンチアバリカルブイソプロピル水和剤
cymoxanil・benthiavalicarb-isopropyl

殺菌剤分類 27, 40

性状 淡褐色水和性細粒

有効年限 4年

有効成分 シモキサニル 60.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル 10.0%

P R T R シモキサニル(PRTR・1種) 60.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装 500g×20袋

■特長

1. 高い予防性と持続性で疫病の発病を抑えます。
2. 高い初期感染抑制効果により、発病を抑えます。
3. 浸達性に優れるため、安定した効果が期待できます。

■適用病害名及び使用方法

(2021年4月21日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	シモキサニルを含む農薬の総使用回数	ベンチアバリカルブイソプロピルを含む農薬の総使用回数	使用方法
ばれいしょ	疫病	2,000～3,000	100～300	収穫7日前まで	4回以内	4回以内	5回以内	散布
		750	25					
		40	1.6					無人航空機による散布
だいず	べと病	3,000	100～300	収穫21日前まで	2回以内	3回以内	2回以内	散布

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. ボルドー液等のアルカリ性農薬との混用はさけてください。
3. 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調整してください。
4. 本剤を希釈倍数750倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を用いて均一に散布してください。
5. 本剤を無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
 - (1) 散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - (2) 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (3) 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
 - (4) 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
 - (5) 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
6. 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
7. 薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
8. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

9. 誤飲・誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
10. 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
11. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
12. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
13. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。