

フルヒカ[®]くん煙剤

(FRUPICA SMOKE)

登録番号 第19887号

種類名 メパニピリムくん煙剤
mepanipyrim

殺菌剤分類 9

性状 類白色発煙性中空円板状
外径65mm 内径20mm 高さ16mm 1個50g

有効年限 5年

有効成分 メパニピリム 15.0%

毒性 医薬用外劇物

包装 (50g×4錠)×10パック×4箱

■特長

1. 施設栽培の主要病害である灰色かび病・うどんこ病に、優れた防除効果を発揮します。
2. 従来剤と異なる作用性（メチオニン生合成阻害）を有するアニリノピリミジン系殺菌剤です。
3. 他剤に耐性を有する灰色かび病・うどんこ病にも、安定した効果を示します。


■適用病害名及び使用方法

(2020年11月25日現在)

作物名	適用場所	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数	使用方法
きゅうり	温室、 ビニール ハウス等 密閉できる 場所	灰色かび病 うどんこ病	くん煙室容積 500m ³	収穫前日 まで	4回以内	4回以内	くん煙 〔通常10～ 15時間〕
いちご					3回以内	3回以内	
みかん		灰色かび病	〔床面積 250m ² 〕 ×高さ2m〕 当り50g (1錠)	開花期～幼果期 〔ただし、収穫 90日前まで〕	2回以内	2回以内	
ぶどう				収穫30日 前まで			

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
2. 温室・ガラス室・ビニールハウス等、防除しようとする室の戸や窓を閉め、室内の可燃物を取り除いてください。室の容積によって使用量を決め、必要に応じてくん煙箇所を数箇所に分けて配置し、煙が満遍なく行きわたるようにしてください。
3. くん煙する場合は、添付のつり具または所定の電気式点火・くん煙装置を使用してくん煙してください。つり具および電気式点火・くん煙装置は栽培作物の高さでつり下げるかまたは不燃性の台などの上のせて使用してください。なお、植物体・可燃物から離れた中央の安全な場所に設置してください。とくにビニールなどの被覆材とは60cm以上離れた位置で使用してください。棚仕立てのぶどうに使用する場合は、つり具および電気式点火・くん煙装置を不燃性の低い台などの上のせて、植物体から離れたなるべく低い位置で使用してください。
4. 点火は以下のとおりに行ってください。
 - (1) 点火紙を用いる場合
同封の点火紙をつり具の所定の位置に正しく設置し、その上に薬剤をのせてから点火紙に点火してください。点火紙を薬剤の上のせて点火すると炎が出るのでさけてください。点火後発煙を確認したら室外に出てそのまま放置してください。発煙直後に万一炎が出た場合は吹き消してください。
 - (2) 電気式点火・くん煙装置を使用する場合
装置は水などに濡れないように設置し、電源がオフになっていることを確認のうえ、薬剤を装置の所定の位置に正しく設置した後に通電してください。点火後発煙したら電源のオフを確認し、くん煙室の外に出てそのまま放置してください。発煙直後に万一炎が出た場合においても、再びくん煙室に入らずに、そのまま放置してください。
 - (3) 点火後はくん煙終了時までくん煙室に入らないでください。
5. 高温時には薬害を生じるおそれがあるので、日中のくん煙はさげ、なるべく夕方温度が下がってからくん煙し、少なくとも8時間は開放しないでください。
6. 室外で強い風が吹いているときは、煙が片寄ってしまい、均一な効果がでにくいので、使用しないでください。
7. きゅうりのうどんこ病に使用する場合、多発生時には効果が劣ることがあるので注意してください。
8. 空袋、空缶等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

▲ 安全使用上の注意 


10. 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
11. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
12. 点火などの作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足・顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
13. くん煙中はハウスへ入らないでください。また、くん煙終了後はハウスを開放し、十分に換気をした後に入室してください。

保管：密封し、火気や直射日光をさげ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

〈備考〉

- ビニールなど被覆材と錠剤は、60cm 以上離してください。
- 点火紙を錠剤の上のせて点火すると炎が出るのでさけてください。



※くん煙剤は通常 10～15 時間（少なくとも 8 時間）は密閉したままとし開放しないでください。