


IGR 殺虫剤

ロムダン®フロアブル

チョウ目害虫の防除に!!

ユニークな
脱皮促進作用



ロムダンは昆虫の脱皮ホルモンの作用を有し、新しい表皮の形成を異常に誘導します。そのため幼虫は速やかに摂食を停止し、脱皮不能または不完全な脱皮状態となり発育できず死に至ります。

適用作物が増えました!

小粒核果類(あんず、うめ、すもも)、
さといも、さといも(葉柄)、
ねぎ、にんじん、しょうが



主な登録作物



ロムダン®フロアブル

IGR 殺虫剤

- テブフェノジド…20.0%
- 人畜毒性…普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- ① ユニークな脱皮促進作用**
 - 従来のキチン合成阻害剤や幼若ホルモンとは異なる昆虫成長制御剤(IGR)です。
 - チョウ目幼虫に対して異常脱皮を誘発し、発育や摂食行動を抑制し、死に至らせます。
- ② 安定した効果**
 - 残効性・耐雨性に優れ、幼虫の発育ステージにかかわらず高い効果を示します。
 - 既存剤に感受性が低下した害虫にも有効です。
- ③ 環境に対する影響の少ない薬剤**
 - 有用昆虫、天敵、鳥類に影響が少ない薬剤です。
 - 登録作物への薬害は認められていません。

上手な使い方 本剤は移行性がありません。対象害虫に対してはラベルに従い所定濃度に希釈液を調製し、害虫発生初期に散布むらのないように十分量を散布してください。

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	使用方法
りんご	ハマキムシ類 キリガ類	1,500~3,000	200~700	収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布
	ケムシ類 シャクトリムシ類						
ぶどう 小粒核果類	ケムシ類	3,000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
おうとう	ハマキムシ類						
もも ネクタリン なし	ハマキムシ類 ケムシ類	2,000	200~400	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
マンゴー	ドクガ類 ハマキムシ類						
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1,000	200~400	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	
	ヨモギエダシャク	2,000					
てんさい	ヨトウムシ	2,000~3,000	100~300	収穫14日前まで	3回以内	3回以内	
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ						
さといも さといも(葉柄) しょうが	ハスモンヨトウ	2,000	100~300	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
れんこん							
だいず							
ねぎ							
にんじん	シロイチモジヨトウ ヨトウムシ	2,000~4,000	100~300	収穫前日まで	2回以内	2回以内	
はくさい キャベツ レタス							
いちご	ハスモンヨトウ	2,000	100~300	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	
そば ほうれんそう							
とうき	キアゲハ	3,000	200~700	発生初期	5回以内	5回以内	
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1,000					
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ		2,000~3,000	200~700	発生初期	5回以内	5回以内
樹木類	ケムシ類						

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので養蚕地帯などでは使用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散してかからないように十分注意して散布してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 保管：直射日光を避け、なるべく涼涼な所に密封して保管してください。

- 使用前は、ラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器等は、圃場等に放置せず適切に処理してください。
- 防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2017年4月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
 ☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084
 ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>
 大阪支店 ☎(06)6229-7343 関東営業所 ☎(048)677-6010
 札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003
 仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336
 信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315