

ホーネスト[®]乳剤

(HOENEST EC)

登録番号 第20355号
 種類名 テプラロキシジム乳剤
 tepraloxymim
 除草剤分類 1
 性状 黄色澄明可乳化油状液体
 有効年限 4年

有効成分 テプラロキシジム 10.0%
 PRTR ナフタレン(PRTR・1種) 3.3%
 メチルナフタレン(PRTR・1種) 16.0%
 直鎖 アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種) 1.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
 危険物 第四類第3石油類 危険等級Ⅲ アルキルベンゼン 火気厳禁
 包装 (100mℓ×10本)×6箱、500mℓ×20本

■特 長

1. スズメノカタビラを含むイネ科雑草に、生育期処理で優れた効果を示します。
2. イネ科雑草の発生から分けつ期まで、幅広い散布適期を有します。
3. 登録作物にかかっても影響はありません。
4. 浸透移行性に優れるため、特に雑草の生長点に作用し、地上部・根部の全身を枯殺します。
5. 雑草体内へ速やかに吸収されるので、散布後に液が乾けば、その後降雨による影響はほとんどありません。

■適用作物・雑草名及び使用方法

(2020年11月25日現在)

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 (雑草生育期) | 10アール当たり 使用量 | | 使用方法 | 本剤およびテ プラロキシジ ムを含む農薬の 総使用回数 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | 薬量 (mℓ) | 希釈水量 (ℓ) | | |
| だ い ず | 一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く) | イネ科雑草6～10葉期 収穫14日前まで | 75～ 100 | 100 | 雑草茎葉散布 または 全面散布 | 1回 |
| あ ず き | 一年生イネ科雑草 | イネ科雑草3～5葉期 収穫14日前まで | | 100～ 150 | | |
| いんげんまめ | | 収穫60日前まで | | | | |
| えだまめ | | 収穫45日前まで | | | | |
| たまねぎ | | 収穫14日前まで | | | | |
| にんじん やまのいも | 一年生および多年生 イネ科雑草 | 収穫30日前まで | 100 | 1回 | | |
| てんさい | 一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く) | イネ科雑草6～8葉期 収穫30日前まで | | | | |

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
2. 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
3. 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
4. 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合は、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
5. 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布してください。
6. 周辺のイネ科作物にかかる薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布してください。

7. 葉面散布肥料との混用または葉面散布肥料散布後の使用は、たまねぎの葉に薬害（癒着）が生じる場合があるのでさけてください。
8. 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川などに流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
9. 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
10. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

11. 原液は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
12. 原液は皮ふに対して刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
13. 散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
14. 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。
15. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、保管してください。

-
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
 - 漏出時は、保護具を着用し布・砂などに吸収させ回収してください。
 - 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
 - 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空ビンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
-

●ホーネスト乳剤の上手な使い方

- ①遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日（スズメノカタビラは2～3週間）を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。