

# ピシロック®フロアブル

(PYTHILOCK FL)

登録番号 第23952号  
 種類名 ピカルブトラゾクス水和剤  
 picarbutrazox  
 殺菌剤分類 U17  
 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体  
 有効年限 4年

有効成分 ピカルブトラゾクス 5.0%  
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
 包装 (100mℓ×10本)×6箱(北海道限定)、500mℓ×20本

## ■特長

1. べと病、疫病、ピシウム病等、卵菌類由来の病害に対して高い効力を発揮します。
2. 新規系統のテトラゾリルオキシム系殺菌剤です(新規作用機構〔推定〕)。
3. 既存の殺菌剤耐性菌に対しても有効ですので、ローテーション散布の1剤として期待できます。
4. 収穫前日まで使用できます。
5. 予防効果が主体の殺菌剤です。浸達活性があります。
6. 登録作物に対する安全性が高い薬剤です。

## ■適用病害名及び使用方法

(2022年4月20日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	ピカルブトラゾクスを含む農薬の総使用回数	使用方法
だいこん	白さび病 ワッカ症	1,000	100～300	収穫前日まで	2回以内	2回以内	散布
ブロッコリー ほうれんそう	べと病						
きゅうり メロン レタス 非結球レタス たまねぎ ねぎ							
キャベツ					ピシウム腐敗病		
トマト ミニトマト ピーマン	疫病				3回以内	3回以内	
すいか なす	褐色腐敗病						
非結球あぶら な科葉菜類	白さび病						
はくさい	べと病 白さび病 ピシウム腐敗病						
てんさい	苗立枯病 (アファノミセス菌) 苗立枯病 (ピシウム菌)	500～1,000	ペーパーポット 1冊当り 1ℓ(3ℓ/m <sup>2</sup> )	は種時～ 定植前	2回以内	2回以内	土壌灌注

## △ 効果・薬害などの注意

1. 使用前によく振ってから使用してください。
2. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
3. 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調整してください。
4. 過度の連用をさけ、なるべく作用機構の異なる薬剤との輪番で使用してください。

## 殺菌剤 ピシロックフロアブル

---

5. 本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないでください。
6. みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場に水がない状態で使用してください。また、使用后 14 日間は入水しないでください。
7. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
8. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

### ⚠ 安全使用上の注意

8. 誤飲などのないよう注意してください。
9. 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。

**保管：**密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。