

トップジンM[®]オイルペースト

(TOPSIN-M OILPASTE)

登録番号 第19259号
 種類名 チオファネートメチルペースト剤
 thiophanate-methyl
 殺菌剤分類 1
 性状 赤色ペースト
 有効年限 4年

有効成分 チオファネートメチル 20.0%
 PRTR チオファネートメチル(PRTR・1種) 20.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 危険物 第四類第3石油類 危険等級III 大豆油 火気厳禁
 包装 1kg×12本

■特 長

1. りんご腐らん病、いちじく株枯病に抑制効果の高いトップジンMを有効成分とし、植物性オイルをベースとして製剤された塗布剤です。
2. 従来の塗布剤に比べ樹皮下まで薬剤がよく浸透しますので、樹皮下の腐らん病菌に対し、強く作用し、治療効果を発揮します。
3. 浸透力が強いので、病患部を粗削りした後に塗布することにより、胴腐らんを治療することができます。

■適用病害名及び使用方法

(2020年11月25日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
りんご	腐らん病	原液	剪定時および病患部 削り取り直後	3回以内	塗布	10回以内 塗布は3回以内 灌注は1回以内 散布は6回以内
いちじく	株枯病		収穫後から休眠期			14回以内 塗布は3回以内 灌注は6回以内 散布は5回以内

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。
2. 使用直前によく攪拌し、原液をそのまま刷毛等で塗布してください。
3. りんご腐らん病の治療に使用する場合、樹皮及び木質部への薬剤の浸透が悪いと効果が劣る場合があるので、病斑をあらく削り取り、周辺健全部への薬剤の浸透性を高めた後、塗布してください。
4. 剪定痕や環状はく皮痕の切り口には使用をさけてください。
5. 本剤の塗布により、樹皮に軽い枯れ込みがみられることがあるので留意してください。
6. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
7. 空容器は、圃場などに放置せず、水洗後、適切に処理してください。
8. 本剤の着色料は、衣服や皮ふに着くと色が落ちにくい場合があるので、衣服や皮ふに付着しないよう注意してください。
9. 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石にかかると変色するおそれがあるので、かからないようにしてください。
10. 使用後の刷毛はそのまま放置せず、水でよく洗っておいてください。
11. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

12. 皮ふに対して弱い刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
13. 使用の際は、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
14. 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
15. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管:密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

殺 菌 剤 トップジンMオイルペースト

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
 - 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
 - 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
 - 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。空容器は、圃場などに放置せず、水洗後適切に処理してください。
-

●トップジンMオイルペーストの上手な使い方

- ①使用後の刷毛が水できれいにならない場合は、家庭用合成洗剤でよく洗っておいてください。