

平成24年 8月 20日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年8月20日付けで新規登録となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ファンタジスタ顆粒水和剤」

(農林水産省登録 第23103号)

【 適用病害名と使用方法 】

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンカルブを 含む農薬の 総使用回数
りんご	黒星病、モニア病 褐斑病、すす点病 斑点落葉病	3,000～ 4,000	200～ 700	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	黒点病、輪紋病 すす斑病	3,000					
おうとう	灰星病 幼果菌核病						
なし	黒斑病、輪紋病	3,000～ 4,000		収穫前日 まで			
	黒星病						
ぶどう	灰色かび病	3,000		収穫14日前 まで			
	晩腐病						
もも ネクタリン	灰星病、黒星病 ホモプシス腐敗病	3,000～ 4,000	収穫14日前 まで				
かんきつ	灰色かび病			2,000～ 4,000			
	そうか病						
茶	炭疽病、輪斑病 新梢枯死症	2,000	100～ 400	摘採7日前 まで	1回	1回	

－ 次ページに続く－

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ピリベンカルブを 含む農薬の 総使用回数
豆類(種実、ただし、 だいず、らっかせい、 あずき、いんげんまめ を除く)	菌核病	2,000	100～ 300	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
あずき いんげんまめ	菌核病、炭疽病 灰色かび病						
だいず	菌核病	2,000～ 4,000					
	紫斑病						
きゅうり	灰色かび病 菌核病	2,000～ 3,000		収穫前日 まで			
トマト ミニトマト	灰色かび病 菌核病、葉かび病						
なす	灰色かび病 菌核病						
いちご	灰色かび病	2,000		収穫14日前 まで			
	炭疽病						
キャベツ	菌核病	2,000～ 3,000					
レタス	灰色かび病 菌核病		収穫14日前 まで				
非結球レタス							
たまねぎ	灰色かび病	2,000～ 4,000	100～ 200	収穫前日 まで	5回以内	5回以内	
	灰色腐敗病	2,000～ 3,000					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336