

2020年2月25日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2020年2月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

### 【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ごぼう」を追加。
2. 作物名「食用ゆり」を追加。
3. 作物名「たまねぎ」に適用病害名「乾腐病」を追加。
4. 作物名「たまねぎ」適用病害名「灰色かび病」使用液量「25L/10a」に、希釈倍数「250倍」を追加。
5. 作物名「たまねぎ」の総使用回数を、「6回以内(苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」から「7回以内(全面土壌混和は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、散布は5回以内)」に変更。

- 次ページに続く -

【 適用病害名と使用方法 】

( **枠線太字**が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
<b>ごぼう</b>	<b>黒条病</b>	<b>1,000</b>	<b>100~300</b>	<b>収穫 21 日 前まで</b>	<b>3 回以内</b>	<b>散布</b>	<b>3 回以内</b>
<b>食用ゆり</b>	<b>葉枯病</b>	<b>1,000</b>	<b>100~300</b>	<b>収穫 14 日 前まで</b>	<b>6 回以内</b>	<b>散布</b>	<b>8 回以内</b> <b>(球根瞬間浸漬は 2 回以内、 散布は 6 回以内)</b>
	<b>鱗茎さび症</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>植付前</b>	<b>2 回以内</b>	<b>球根瞬間 浸漬</b>	
たまねぎ	<b>乾腐病</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>定植直前</b>	<b>1 回</b>	<b>5 分間 苗根部浸漬</b>	
	灰色腐敗病 べと病	1,000~ 2,000	100~300	収穫 3 日 前まで	5 回以内	散布	<b>7 回以内</b> <b>(全面土壌混和は 1 回以内、 苗根部浸漬は 1 回以内、 散布は 5 回以内)</b>
	灰色かび病	1,000~ 2,000					
		<b>250~500</b>	25				
白色疫病	1,000	100~300					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336