

2020年3月25日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2020年3月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トップジンM水和剤」

(農林水産省登録 第11573号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「甘草」を追加。
2. 作物名「ねぎ」の使用法「苗床灌注」の処理液量を「チェーンポット1冊(30×60cm、土壌量約5L) 当り0.5~1L」に変更。
3. 作物名「レタス」の使用法「灌注」に適用病害名「菌核病」を追加。
4. 作物名「りんご」、「なし」及び「つつじ類」の希釈倍数を次のとおり変更。
 - ・「1,500倍~2,000倍」を「1,000倍~2,000倍」に変更。
 - ・「1,500倍」を「1,000~1,500倍」に変更。
5. 作物名「びわ」の希釈倍数について「1,000倍」を「800~1,000倍」に変更。
6. 作物名「いちじく」の希釈倍数について「1,500倍」を「1,000~1,500倍」に変更。
7. 作物名「小麦」及び「麦類(小麦を除く)」の希釈倍数を次のとおり変更。
 - ・「2,000~2,500倍」を「1,000~2,500倍」に変更。
 - ・「2,000倍」を「1,000~2,000倍」に変更。
8. 作物名「だいず」の希釈倍数について「1,000~1,500倍」を「700~1,500倍」に変更。
9. 作物名「あずき」の希釈倍数について「1,000倍」を「700~1,000倍」に変更。
10. 作物名「たまねぎ」の希釈倍数について「1,000倍」を「500~1,000倍」に変更。
11. 作物名「ぶどう」、「樹木類(つつじ類、かし、さくら、じんちょうげ、ぼけ、ポプラ、いぬつげを除く)」、「さくら」、「かし」、「じんちょうげ」、「ぼけ」、「ポプラ」、「いぬつげ」及び「桑」の希釈倍数「1,500~2,000倍」を「1,000~2,000倍」に変更。
12. 作物名「小粒核果類」の希釈倍数について「1,500倍」を「1,000~1,500倍」に変更。

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(**枠線赤字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チアネートMを含む 農薬の総使用回数
りんご	菌核病 灰色かび病	1,500~2,000	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 灌注は1回以内、 散布は2回以内)
	すそ枯病	1,500	1.5L/m ²	収穫45日 前まで	1回	灌注	
ビッグベイン病 菌核病							
ねぎ	小菌核腐敗病	1,000	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	5回以内 (種子への処理は 1回以内、 苗根部浸漬及び 苗床灌注は 合計1回以内、 散布及び 株元散布は 合計3回以内)
		250	フェンポット 1冊(30×60cm、 土壌量約5L) 当り0.5~1L	定植直前	1回	苗床灌注	
	20	-	3分間 苗根部浸漬				
	200		30分間 苗根部浸漬				
甘草	株枯病			植付前		30分間 苗浸漬	1回
りんご	黒星病 うどんこ病 黒点病 褐斑病	1,000~2,000	200~700 L/10a	収穫前日 まで	6回以内	散布	10回以内 (塗布は3回以内、 灌注は1回以内、 散布は6回以内)
	腐らん病 モリア病(実腐れ) 輪紋病 すす点病 すす斑病	1,000~1,500					
	白紋羽病	500~1,000	-	休眠期~ 生育期	1回	灌注	
なし	黒星病 うどんこ病	1,000~2,000	200~700 L/10a	収穫前日 まで	6回以内	散布	11回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、 灌注は1回以内、 生育期の散布は 6回以内)
	腐らん病	1,000					
	輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌) 胴枯病	1,000~1,500					
	白紋羽病	500~1,000	-	休眠期	1回	灌注	

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(枠線赤字が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チファネートMを含む 農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病 褐斑病 うどんこ病 黒とう病	1,000~2,000	200~700 L/10a	収穫45日 前まで	1回	散布	5回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、 生育期の散布は 1回以内)
	晩腐病 芽枯病	1,000					
	苦腐病	1,000~1,500					
びわ	ごま色斑点病	800	-	収穫14日 前まで	3回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内、 灌注は1回以内)
	灰斑病	800~1,000					
	白紋羽病	300~ 500		収穫後 (7月上旬 ~9月上旬)	1回	灌注	
小粒核果類	灰星病 環紋葉枯病 葉炭疽病 黒星病 黒粒枝枯病	1,000~1,500	200~700 L/10a	収穫21日 前まで	3回以内	散布	すももは6回以内 (塗布は3回以内、 休眠期の散布は 1回以内、 生育期の散布は 3回以内)、 その他の 小粒核果類は 6回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内)
	いちじく	黒葉枯病					
	黒かび病 そうか病	1,000~1,500	1~10L/株	収穫前日 まで	6回以内	灌注	
	株枯病	500					
小麦	雪腐病	1,000~2,500	60~150 L/10a	根雪前	3回以内 (出穂期 以降は 2回以内)	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内、 出穂期以降は 2回以内)
	雪腐大粒菌核 病	1,000					
		250~500	25L/10a				
	赤かび病	250		60~150 L/10a			
	うどんこ病	1,000~2,000					
	眼紋病	1,000					

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(**枠線赤字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	珒ファネートMを含む 農薬の総使用回数
麦類 (小麦を 除く)	雪腐病	1,000~2,500	60~150 L/10a	根雪前	3回以内 (出穂期 以降は 1回以内)	散布	3回以内 (種子への処理は 1回以内、 出穂期以降は 1回以内)
	赤かび病	1,000~1,500		収穫30日 前まで			
	うどんこ病	1,000~2,000					
	眼紋病	1,000					
だいず	紫斑病	700~1,500	-	は種前	1回	粉衣	4回以内 (種子への処理は 1回以内)
	菌核病	700~1,000	100~300 L/10a	収穫14日 前まで	4回以内	散布	
あずき	菌核病 輪紋病 炭疽病						5回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は4回以内)
たまねぎ	小菌核病 灰色腐敗病	500~1,000	-	収穫前日 まで	6回以内 (但し 定植後は 5回以内)	5分間 苗根部 浸漬	
	灰色腐敗病	500	-	定植直前			
樹木類 (つつじ類、 かし、さくら、 じんちょうげ、 ぼけ、ポプラ、 いぬつげを 除く)	炭疽病	1,000~2,000	200~700 L/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
	うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症 (シュート・サコスポウ菌)	1,000					
つつじ類	褐斑病	1,000~1,500	100~300 L/10a	5回以内	5回以内	散布	5回以内
さくら	炭疽病	1,000~2,000	200~700 L/10a				
	幼果菌核病	1,000~1,500					
さくら	うどんこ病 ごま色斑点病 輪紋葉枯病 斑点症 (シュート・サコスポウ菌)	1,000	200~700 L/10a	5回以内	5回以内	散布	5回以内
	炭疽病	1,000~2,000					

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(**枠線赤字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チファネートMを含む 農薬の総使用回数
かし	炭疽病	1,000~2,000	200~700 L/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
	紫かび病	1,000					
うどんこ病							
ごま色斑点病							
輪紋葉枯病							
斑点症 (シュート・サーコスポ®ラ菌)							
黒点病	100~300 L/10a						
炭疽病			1,000~2,000				
ぼけ	褐斑病		1,000				
	うどんこ病						
ホヅラ	ごま色斑点病	1,000					
	輪紋葉枯病						
	斑点症 (シュート・サーコスポ®ラ菌)						
	マルガニサ落葉病	1,000~2,000	200~700 L/10a				
	炭疽病						
いぬつげ	枝枯病	1,000					
	うどんこ病						
	ごま色斑点病						
	輪紋葉枯病						
	斑点症 (シュート・サーコスポ®ラ菌)	1,000~1,500					
	裏うどんこ病						
桑	汚葉病	1,000~2,000	100~300 L/10a	-	3回以内	3回以内	
	輪斑病						

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336