

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2021年1月27日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「アベイル粒剤」

(農林水産省登録 第23623号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「だいこん」を追加。
2. 作物名「きゅうり」に適用害虫名「ウリハムシ」を追加。
3. 作物名「キャベツ」、「はくさい」、「ブロッコリー」、「レタス」に使用量「1g/株」を追加。
4. 「使用上の注意事項」に、以下の項目を追加。
(2) 本剤を使用しただいこんは、つまみ菜、間引き菜として食用に供さないこと。

- 次ページに続く -

【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセチリドを含む農薬の総使用回数	シントラリプロールを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ コガ アオムシ キスジノミハムシ	6kg/10a	は種時	1回	播溝 土壌 混和	1回	4回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、 散布は3回以内)
きゅうり	コガムシ類 アブラムシ類 アザミウマ類 カリハムシ	2g/株			5回以内 (粒剤の 定植時までの 処理は1回以内、 2%粒剤の定植後 の株元散布は 1回以内、 散布、くん煙及び 1%粒剤の株元散布 は合計3回以内)	株元 散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
キャベツ	アブラムシ類 コガ アオムシ ハスモンヨトウ ネアザミウマ ハイマダラノメイガ	1g/株 セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5 ~4L) 当り 40g	育苗期後半 ~定植当日		6回以内 (粒剤の 定植時までの 処理は1回以内、 散布及び定植後 の株元散布は 合計5回以内)		
はくさい	ハイマダラノメイガ アブラムシ類 コガ アオムシ	1g/株 セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5 ~4L) 当り 40g			4回以内 (粒剤の 定植時までの 処理は1回以内、 散布及び定植後 の株元散布は 合計3回以内)		
ブロッコリー	アオムシ アブラムシ類 ネアザミウマ コガ ハスモンヨトウ	1g/株 セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5 ~4L) 当り 40g					

- 次ページに続く -

日曹農薬登録速報 210127-1 アベイル粒剤

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセミプリドを含む農薬の総使用回数	シアントリプロールを含む農薬の総使用回数
トマト	タバコ ヨウムシ アブラムシ類 ナメクジ	1g/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	株元 散布	4回以内 (粒剤の株元散布 は1回以内、 散布は3回以内)	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
		セル成型育苗トレイ 1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5 ～4L) 当り 40g					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336