

2022年2月9日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2022年2月9日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベフトップジンフロアブル」

(農林水産省登録 第21860号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「かんきつ(みかんを除く)」及び「みかん」に使用方法「無人航空機による散布」を追加。
2. 作物名「かんきつ(みかんを除く)」及び「みかん」に適用病害名「貯蔵病害(黒斑病)」を追加。
3. 作物名「小麦」に適用病害名「葉枯症」及び「赤さび病」を追加。
4. 作物名「小麦」の適用病害名「雪腐大粒菌核病」の希釈倍数を「750倍」から「750~1,000倍」に変更。
5. 「使用上の注意事項」を以下のとおり変更。
(4) ボルドー液とは沈殿を生じるので混用しないこと。塩化銅等の無機銅剤との混用はさけること。
(5) 日本なし、もも、うめ等の果実、稲、きゅうり、あぶらな科作物、まめ類には、葉に葉害を生じることがあるのでかからないように注意して散布すること。
(6) かんきつの施設栽培で果実の着色終了前に使用する場合、果実に着色むらを生じるおそれがあるので、降雨時等の極端な多湿条件下での散布はさけること。

— 次ページに続く —

【適用病害名・使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈 倍数 (倍)	使用 液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチル を含む農薬の 総使用回数
小麦	うどんこ病 葉枯症 赤さび病	800~ 1,000	60~ 180	収穫14日 前まで	3回以内 (出穂期 以降は 1回以内)	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 散布及び 無人航空機 散布は 合計3回以内、 出穂期以降は 1回以内)	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内、 出穂期以降は 2回以内)
	赤かび病							
	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病	750~ 1,000	60~180					
	赤かび病	8倍	0.8	収穫14日 前まで		無人航空機 による散布		
みかん	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(こうじかび病)	1,500	200~ 700	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人航空機散布は 合計5回以内)
	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病)	25	8					
	かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) 貯蔵病害(黒斑病)	1,500	200~ 700		収穫前日 まで		

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪支店 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336