

平成23年12月14日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成23年12月14日付けで一部使用制限になる登録変更となりましたので、
ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ビーナイン水溶剤80」

(農林水産省登録 第12842号)

【 変更内容の概要 】

※ 全ての適用作物が「(施設栽培)」に限定されました。

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「パンジー(施設栽培)」(使用目的：節間の伸長抑制)を追加。
2. 作物名「はぼたん」について、次のとおり変更。
 - ① 作物名「はぼたん」を「はぼたん(施設栽培)」に変更。
 - ② 希釈倍数「100~200倍」、使用時期「定植後3日目」の適用を削除。
 - ③ 希釈倍数を「200~400倍」とする使用時期「子葉展開後」及び「鉢上げ後」を追加しそれぞれの使用時期について本剤の使用回数を「2回以内」とする。
 - ④ ダミノジッドを含む農薬の総使用回数を「1回」から「4回以内」に変更。
3. 作物名「ペチュニア」について、次のとおり変更。
 - ① 作物名「ペチュニア」を「ペチュニア(施設栽培)」に変更。
 - ② 使用時期に「鉢上げ後」を、希釈倍数「200~400倍」、本剤の使用回数「4回以内」で追加。
 - ③ ダミノジッドを含む農薬の総使用回数を「1回」から「6回以内(水溶剤は4回以内)」に変更。
4. 作物名「きく(切花用)」について、次のとおり変更。
 - ① 作物名「きく(切花用)」を「きく(切花用)(施設栽培)」に変更。
 - ② 使用目的「花首の伸長抑制」の希釈倍数を「500~5000倍」に変更。
5. 作物名「ハイドランジア」、「きく(ポットマム)」、「ポインセチア」、「アザレア」、「あさがお」及び「しゃくなげ」に、それぞれ「(施設栽培)」を追記する。
6. 「使用上の注意事項」に、以下の注意事項を追加。
 - ・ 移動可能な容器(鉢、プランター、コンテナ等)を用いて栽培する場合、施設の外に移動して栽培・管理する期間は、本剤を使用しないこと。
 - 又、施設を撤去して栽培・管理する期間は、本剤を使用しないこと。

— 次ページに続く —

- ・ はぼたんについて以下のことを注意すること。
 - 1) 子葉展開後から使用する場合、1回目は播種後10日目を、2回目は播種後20日目を目安に散布すること。また3回目は鉢上げ3～5日後を、4回目は3回目処理の1週間後を目安に散布すること。
 - 2) 使用時期が遅い場合には着色が遅延する場合がありますので、適切な使用時期を逸さないよう注意すること。
 - ・ ペチュニアについて以下のことを注意すること。
 - 1) 鉢上げ後に使用する場合、1回目は鉢上げ1週間後を目安に散布し、2回目以降は1～2週間程度の間隔で散布すること。
 - 2) 着蕾期に使用すると花色が薄くなる場合や、花が小型化する場合がありますので、着蕾期の使用はさけること。
 - ・ パンジーに使用する場合、1回目は鉢上げ後1週間後を目安に散布し、以後は1週間程度の間隔で散布すること。
7. 「安全上の注意事項」に、以下の注意事項を変更、追加。
- ・ 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換すること。
 - ・ 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。

— 次ページに続く —

【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	使用目的	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ダミゾットを 含む農薬の 総使用回数	
きく (切花用) 施設栽培	節間の伸長抑制	500~ 5,000	50~150 L/10a	生育期	4回以内	茎葉 散布	6回以内	
	花首の伸長抑制			発蕾期~摘蕾期	2回以内			
きく (ポットマム) 施設栽培	節間の伸長抑制	200~400	5~10mL /5号鉢	摘芯後7~10日 又は定植3日後 から発蕾初期	3回以内		3回以内	
ポインセチア 施設栽培		100~200		定植後3~30日	1回		1回	
ハイドラングア 施設栽培								2回以内
はぼたん 施設栽培		200~400			子葉展開後		2回以内	4回以内
				鉢上げ後				
ペチュニア 施設栽培		100~200		50~150 L/10a	定植後2週間目		1回	6回以内 (水溶剤は 4回以内)
		200~400			鉢上げ後		4回以内	
アザレア 施設栽培		150			摘芯後30~40日		1回	3回以内
		200~400			摘芯後30~120日	3回以内		
あさがお 施設栽培		400~800			本葉5~7枚の時	1回	1回	
パンジー 施設栽培	200~400	鉢上げ後	4回以内		4回以内			
しゃくなげ 施設栽培	節間の伸長抑制 着蕾数増加	75~100	100mL /5号鉢		新梢伸長完了期を 1回目として3回 処理(1ヵ月間隔)	3回	3回	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336