

平成24年 2月 8日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年2月8日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイド水和剤」

(農林水産省登録 第17557号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「てんさい」の適用病害虫名「黒根病」について、使用液量「一」を「3L/m²」に変更し
使用方法「3L/m² 苗床土壌灌注」を「苗床土壌灌注」に変更。
- 作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「粉状そうか病、塊茎褐色輪紋病」および作物名「小麦」の
適用病害虫名「縞萎縮病」について、使用方法「全面散布後土壌混和」を「全面散布土壌混和」に変更。
- 作物名「チューリップ」に適用病害虫名「条斑病、微斑モザイク病」を追加。
- 「使用上の注意事項」(9)について、以下のとおり変更。

(9)全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和すること。
降雨直後の処理は混和むらの原因となるので避けること。

【 適用病害虫名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアザムを含む 農薬の総使用回数
てんさい	根腐病	1,000~ 2,000	100~300	収穫 30 日前 まで	4 回以内	散布	5 回以内 (は種前の土壌混和 及び苗床灌注は合 計 1 回以内、株元 散布は 4 回以内)
	黒根病	1,000					
		100	3L/m²	移植前	1 回	苗床土壌灌注	

— 次ページに続く —

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量 (g/10a)	希釈水量 (L/10a)				
ばれいしょ	粉状そうか病 塊茎褐色輪紋病	600	100	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)
チューリップ	条斑病 微斑モザイク病			7回以内			
小麦	縞萎縮病			は種前			3回以内 (は種前は1回以内、は種後は2回以内)

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336