

平成24年6月13日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年6月13日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。
(記)

「日曹スカウトフロアブル」

(農林水産省登録 第17253号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「だいこん」、「非結球あぶらな科葉菜類」、「なばな」、「アスパラガス」(適用害虫名:ヨウムシ)を追加。
2. 作物名「レタス」(適用害虫名:アブラムシ類)を追加。
3. 作物名「ブルーベリー」(適用害虫名:オウトウジョウジョウバエ)を追加。
4. 作物名「すもも」、「うめ」及び「小粒核果類(うめ、すももを除く)」の「アブラムシ類」の希釈倍数に「3000倍」を追加し、「2000~3000倍」とする。
5. 作物名「キャベツ」に適用害虫名「タマナギンウワバ」を追加。
6. 作物名「ばら」、「きく」、「宿根かすみそう」、「グラジオラス」、「トルコギキョウ」、「りんどう」及び「花き類・観葉植物(ばら、きく、宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)」を以下のとおり変更。
 - ① 作物名「宿根かすみそう」、「グラジオラス」、「トルコギキョウ」、「りんどう」及び「花き類・観葉植物(ばら、きく、宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)」の適用害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数を「2000倍」から「2000~3000倍」に変更。
 - ② 作物名「花き類・観葉植物(ばら、きく、宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)」、「ばら」及び「きく」をまとめて「花き類・観葉植物(宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)」に変更。
7. 作物名「りんご」、「なし」、「もも」、「ネクタリン」、「おうとう」、「すもも」、「うめ」、「かき」、「ぶどう」、「みかん」、「かんきつ(みかんを除く)」、「びわ」、「いちじく」、「キウイフルーツ」、「小粒核果類(うめ、すももを除く)」及び「つつじ類」の使用量を「200~700L/10a」とする。
8. 作物名「キャベツ」、「はくさい」、「きゅうり」、「なす」、「メロン」、「すいか」、「さやえんどう」、「実えんどう」、「しょうが」、「ばれいしょ」、「宿根かすみそう」、「グラジオラス」、「トルコギキョウ」、「りんどう」及び「花き類・観葉植物(宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)」の使用量を「100~300L/10a」とする。

— 次ページに続く —

8. 作物名「茶」の使用量を「200～400L/10a」とする。
9. 作物名「芝」の使用量「1m² 当り 200～300ml散布」を「散布」に変更。また、使用量を「200～300ml/m²」とする。

【適用害虫名と使用方法】

(枠線太字が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トラロトリンを含む農薬の 総使用回数		
りんご	ハマキムシ類 キンモンホリガ シンクイムシ類	2,000	200～700 L/10a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内		
	アブラムシ類 キンモンハモグリガ	1500～ 2,000							
なし	アブラムシ類	1,500							
	カメムシ類								
もも	ナシチビガ シンクイムシ類	2,000							
	アブラムシ類	2,000～ 3,000							
ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類							2,000	
	アブラムシ類								
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ	3,000						2 回以内	2 回以内
すもも	シンクイムシ類	2,000						3 回以内	3 回以内
うめ	アブラムシ類	2,000～ 3,000							
	カメムシ類	2,000							
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2,000～ 3,000	収穫 14 日前 まで	1 回	1 回				
かき	カメムシ類	1,500	5 回以内	5 回以内					
	アザミウマ類	2,000							
	カキハタムシガ	1,500～ 2,000							
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバイ	2,000～ 3,000	3 回以内	3 回以内					
	ハマキムシ類	2,000							
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ	3,000	収穫前日 まで	2 回以内	2 回以内				
かんきつ (みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ	2,000～ 4000	5 回以内	5 回以内					
みかん									
びわ	アブラムシ類	2,000	収穫 3 日前 まで	3 回以内	3 回以内				

— 次ページに続く —

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トラロメリンを 含む農薬の 総使用回数	
いちじく	アザミウマ類	2,000	200~700	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
キウイフルーツ	キロマイカ*	1,500~ 2,000	L/10a		5回以内		5回以内	
キャベツ	タナキンウワバ	2,000	100~300 L/10a		3回以内		3回以内	
はくさい	アブラムシ類 コナガ、アオムシ ヨウムシ	1,500~ 3,000			収穫7日前 まで		2回以内	2回以内
	レタス				アブラムシ類		収穫21日前 まで	4回以内
アスパラガス	ヨウムシ	2,000			4回以内			
だいこん								
非結球あぶらな科 葉菜類								
なばな	アブラムシ類	2,000~ 3,000			100~300 L/10a		4回以内	4回以内
きゅうり								
なす	アブラムシ類	1,500~ 3,000		100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	
すいか メロン		2,000				5回以内	5回以内	
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1,500	2回以内		2回以内			
しょうが	アワメイガ		5回以内		5回以内			
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ	2,000	5回以内		5回以内			
茶	チャノトリヒメコバイ チャノソガ	3,000	200~ 400L/10a		摘採7日前 まで	3回以内	3回以内	
宿根かすみそう	ヨウムシ	2,000	100~ 300L/10a		—	5回以内	5回以内	
	アブラムシ類	2,000~ 3,000						
グラジオラス トルコギキョウ	アザミウマ類	2,000						
つつじ類	ツツジガンバイ							200~ 700L/10a

— 次ページに続く —

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トラロトリンを含む農薬の 総使用回数
芝	シバツガ スジキリヨウ	1,500	200~300 ml/m ²	発生初期	5回以内	散布	5回以内
りんどう	ヒラスハナアザミウマ	2,000	100~ 300L/10a	—			
花き類・観葉植物 (宿根かすみそう、 グラジオラス、トルコギキョウ、 りんどうを除く)	アブラムシ類	2,000~ 3,000					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336