

平成24年8月29日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年8月29日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ラビライト水和剤」

(農林水産省登録 第11995号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「ぶどう」について、次のとおり変更。
 - 本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更。
 - チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内)」から「5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内)」に変更。
 - 使用量を「200~700L/10a」とする。
- 作物名「みかん」「りんご」「なし」、及び「かき」の使用量を「200~700L/10a」とする。
- 作物名「ばれいしょ」「やまのいも」「ばら」、及び「チューリップ」の使用量を「100~300L/10a」とする。

【適用病害虫名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	マンネブを含む農薬の総使用回数
ぶどう	晩腐病	800~1,000		落弁期まで(但し、収穫75日前まで)	1回		5回以内 (塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内)	2回以内
みかん	灰色かび病 黒点病、 そうか病 小黒点病 カンザビダニ	500~800	200~700	収穫60日前まで	2回以内	散布	8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人ヘリ散布は合計 5回以内)	2回以内
	黄斑病 そばかす病	500						

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240829-5 ラビライト水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数	マンネブを含む 農薬の 総使用回数
りんご	うどんこ病 褐斑病	600	200~ 700	収穫 60 日 前まで	2 回以内	散布	10 回以内 (塗布は 3 回以内、 灌注は 1 回以内、 散布は 6 回以内)	2 回以内
	黒星病 斑点落葉病	500~ 600						
なし	黒星病 黒斑病	500~ 800		収穫 45 日 前まで	3 回以内		11 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回 以内、灌注は 1 回 以内、生育期の散布 は 6 回以内)	3 回以内
	輪紋病	500						
かき	炭疽病 うどんこ病 落葉病	500~ 800		収穫 14 日 前まで	2 回以内		10 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回 以内、生育期の散布 は 6 回以内)	2 回以内
ばれいしょ	疫病	400~ 600						
やまのいも	炭疽病 葉渋病	400						
ばら	黒星病 うどんこ病	500~ 800		100~ 300	—		5 回以内	5 回以内
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病							

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336