

平成27年11月25日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成27年11月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「かき」に、適用病害名「黒星落葉病」を追加。
2. 作物名「ばれいしょ」に、適用病害名「菌核病」を追加。
3. 作物名「キャベツ」に、適用病害名「菌核病」を追加。
4. 作物名「うるし」(適用病害名：白紋羽病)を追加。
5. 「使用上の注意事項」のうち、以下の項目を変更。(変更箇所：下線部)
 - ・かんきつに使用する場合は、次の事項に注意すること。
*レモンに薬害を生じるので使用をさけること。
 - ・ぶどうに使用する場合、葉や果実に薬害が発生するおそれがあるので、使用時期を厳守すること。なお、ネオマスカットは特に薬害を生じやすいので使用をさけること。
 - ・全面散布土壌混和で使用する場合、所定量の薬量を均一に散布し、土壌と十分混和すること。
降雨直後の処理は、混和むらの原因となるのでさけること。

— 次ページに続く —

【 適用病害名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルジムを含む 農薬の総使用回数
かき	落葉病 黒星落葉病 炭疽病 灰色かび病	2,000	200~700 L/10a	収穫 45 日前 まで	1 回	散布	1 回
ばれいしょ	疫病	500	25 L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	6 回以内 (種いも浸漬は 1 回以内、 植付前の土壌混和 は 1 回以内、 散布は 4 回以内)
		1,000~ 2,000					
	菌核病	1,000	100~300 L/10a				
	夏疫病	2,000					
そうか病	100	—	植付前	1 回	種いも 瞬間浸漬		
うるし	白紋羽病	500	20~50 L/樹	発病前	1 回	土壌灌注	1 回

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルジムを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
キャベツ	菌核病 根こぶ病	500 mL/10a	100~200 L/10a	は種 又は 定植前	2回以内 (苗床では1回以内、 本圃では1回以内)	全面散布 土壌混和	2回以内 (苗床では1回以内、 本圃では1回以内)

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336