

平成29年5月17日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が平成29年5月17日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

### 「ホーマイ水和剤」

(農林水産省登録 第13682号)

#### 【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「芝」について、以下のとおり変更。
  - ①適用病害名「葉腐病（ブラウンパッチ）」の、使用量を「0.5~2 L/m<sup>2</sup>」とし、使用方法を「散布」に変更。
  - ②適用病害名「ヘルミントスポリウム葉枯病」及び「疑似葉腐病（春はげ症）」の使用量を「2 L/m<sup>2</sup>」とし、使用方法を「散布」に変更。
- 作物名「野菜類（豆類（未成熟）を除く）」、「豆類（種実）」、「豆類（未成熟）」、「花き類」及び「芝」以外の作物について、使用量を「—」とする。
- 作物名「西洋芝（ベントグラス）」を追加。
- 作物名「芝」を、「芝（ベントグラスを除く）」に変更。
- 「安全上の注意事項」について、全文を以下のとおりに変更。
  - (1)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
  - (2)散布液調製時及び使用の際は保護眼鏡、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
  - (3)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
  - (4)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
  - (5)公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- 「使用上の注意事項」について、以下を追加。（※平成29年4月25日付け変更）
  - (12)本剤を使用したつまみ菜、間引き菜等の幼植物は食用に供しないこと。

— 次ページに続く —

【 適用病害虫名と使用方法 】

( **枠線太字** が変更部分 )

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チラムを含む農薬の総使用回数	チファネートMFLを含む農薬の総使用回数			
稲	イシガレセンチュウ	乾燥種もみ重量の1.0%	☐	浸種前	1回	種子粉衣(湿粉衣)	1回	3回以内 (種子への処理は1回以内)			
	いもち病 ごま葉枯病 ばか苗病 苗立枯病	乾燥種もみ重量の0.5~1.0%				10分間 種子浸漬					
		20~30倍				24~48時間 種子浸漬					
		200倍				6~24時間 種子浸漬					
いもち病 ばか苗病	400倍	24~48時間 種子浸漬									
	きゅうり	つる割病 苗立枯病		種子重量の0.5~1.0%		は種前			種子粉衣	6回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は5回以内)	
すいかの接木用のゆうがお		つる割病		200倍					30~60分間 種子浸漬		
	種子重量の0.5~1.0%			種子粉衣							
トマト	萎凋病	200倍		☐		植付前			20~30分間 種子浸漬	1回	4回以内 (種子への処理は1回以内)
にんにく	黒腐菌核病 イモガサセンチュウ	種球重量の1.0%							種球粉衣(湿粉衣)		
だいず	紫斑病	種子重量の0.5%	は種前		種子粉衣		4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人へ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)				
小麦	斑葉病 なまぐさ黒穂病	種子重量の0.5~1.0%			6~24時間 種子浸漬						
		200倍		種子粉衣	3回以内 (種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内)						
麦類 (小麦を除く)		種子重量の0.5~1.0%	は種前	種子粉衣(湿粉衣)	1回						
はとむぎ	葉枯病 黒穂病	乾燥種子重量の0.5~1.0%		72時間 種子浸漬							
		200倍									

— 次ページに続く —

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チラムを含む農薬の総使用回数	チアフェネトメチルを含む農薬の総使用回数
チューリップ すいせん、ゆり グラジオラス フリージア	球根腐敗病	200倍				30分間 球根浸漬		
		球根重量 の1.0%				球根粉衣		
ストック アスター けいとう べにばな シクラメン まつ、すぎ ひのき	苗立枯病	200倍	☐	植付前 又は 貯蔵前	1回	30分間 種子浸漬	1回	5回以内
		種子重量 の1.0%				種子粉衣		
芝 (パントグラス を除く)  西洋芝 (パントグラス)	疑似葉腐病 (春はげ症)	1000倍	2L/m <sup>2</sup>	休眠期前				
	ヘルミントス® リウム葉枯病							
	葉腐病 (ブライハット)	100倍	0.5~ 2L/m <sup>2</sup>	発病初期	8回以内	散布	8回以内	8回以内
	炭疽病		0.05L/m <sup>2</sup>					
		500~ 1000倍	0.5L/m <sup>2</sup>	休眠期前				
	ダラースポット病	100倍	0.05L/m <sup>2</sup>					
	ヘルミントス® リウム葉枯病	1000倍	2L/m <sup>2</sup>	休眠期前				
	疑似葉腐病 (春はげ症)							

以上

札幌営業所 Tel:011-241-5581  
 仙台営業所 Tel:022-227-1741  
 関東営業所 Tel:048-677-6010  
 信越営業所 Tel:0255-81-2323

名古屋営業所 Tel:052-238-0003  
 大阪支店 Tel:06-6229-7343  
 松山営業所 Tel:089-931-7315  
 福岡営業所 Tel:092-771-1336