

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成30年12月5日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベフラン液剤25」

(農林水産省登録 第21467号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」に適用病害名「なまぐさ黒穂病」(原液/乾燥種子1kg当り3~5mL/種子吹き付け処理又は塗沫処理)を追加。

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノカタジンを 含む農薬の 総使用回数
麦類(小麦を除く)	雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病	1,000	60~150 L/10a	根雪前	2回以内	散布	3回以内 (種子への処理 は1回以内、 散布は2回以内)
	紅色雪腐病	10	乾燥種子 1kg当り 30~50ml	は種前	1回	塗沫処理	
		5	乾燥種子 1kg当り 15~25ml				
	紅色雪腐病、条斑病 斑葉病、網斑病、ふ枯 病、 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg当り 3~5ml			種子吹き付け 処理又は 塗沫処理	
	斑葉病	250~500	-			10~30分間 種子侵漬	
	なまぐさ黒穂病	1,000~ 2,000					

- 次ページに続く -

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数
小麦	紅色雪腐病	250	25 L/10a	根雪前 収穫 14 日 前まで	3 回以内 (但し、出穂 期以降は 1 回以内)	散布	4 回以内 (種子への処理 は 1 回以内、 散布及び 無人航空機 散布は合計 3 回以内、 出穂期以降 は 1 回以内)
	雪腐大粒菌核病、 紅色雪腐病	1,000	60~150 L/10a				
	うどんこ病、葉枯病						
	赤かび病	1,000~ 2,000	乾燥種子 1 kg 当り 30~50 ml	は種前	1 回	塗沫処理	
	紅色雪腐病	10					
	紅色雪腐病、条斑病 ふ枯病、 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1 kg 当り 3~5ml	種子吹き付け 処理又は 塗沫処理			
	なまぐさ黒穂病	1,000~ 2,000	—	10~30 分間 種子侵漬			

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336