

水稻におけるいもち剤の現状と
トップジンMの位置付けについて
武田 敏幸（本文P2～7）



写真1 葉いもち



写真2 穂いもち

福島県におけるリンゴ褐斑病の防除と
トップジンM水和剤
菅野 英二（本文P12～14）



写真1 リンゴ褐斑病（葉）

アラカルト
（本文P52）



長野県におけるリンゴ腐らん病防除対策と
トップジンMペースト
飯島 章彦（本文P15～21）



写真1 採果痕から発病した枝腐らん



写真2 主幹に発生した胴腐らんの末期症状



写真3 せん定痕から発生した初期病斑



写真4 トップジンMペーストを塗布して治癒した胴腐らん



写真5 主幹・主枝の切口にはすべてに塗布剤を塗る

北海道におけるマメ類菌核病および
灰色かび病の防除とトップジンM水和剤

清水 基滋（本文P22～27）



写真1 インゲンマメ菌核病：葉および
莢の初期病徴



写真2 インゲンマメ菌核病：発病莢か
ら茎への接触感染



写真3 インゲンマメ菌核病：莢上に形
成された菌核



写真4 インゲンマメ菌核病：まん延状
況



写真5 インゲンマメ菌核菌：子のう盤



写真6 インゲンマメ灰色かび病：感染
した花弁に形成された分生子



写真7 インゲンマメ灰色かび病：葉に
形成された水浸状病斑



写真8 インゲンマメ灰色かび病：葉の
褐色輪紋病斑



写真9 インゲンマメ灰色かび病：莢
の病徴

モスピラン水溶剤のリンゴ害虫に対する
作用特性と防除効果

花井 大輔（本文P37～42）



写真1 リンゴワタムシ（ワタ状分泌物
で虫体は隠れている）



写真2 リンゴワタムシ（ワタ状分泌物
を吹き飛ばした状態）



写真3 キンモンホソガ有脚幼虫による
潜孔（t.f.マイン、矢印部分）