

化学農薬の天敵・天敵微生物への影響について

和田 哲夫（本文P23～28）



タイリクヒメハナカメシ成虫による
ミカンキロアザミウマの捕食（山本原図）



スワルスキーカブリダニ成虫による
オンシツコナジラミ幼虫の捕食
（Koppert社原図）



コナジラミ、スリップス等の天敵（Koppert社原図）

ロムダンフロアブルの殺虫効果について

日本曹達(株) 農業化学品事業部
普及グループ（本文P9～16）



ロムダンフロアブルの症状発現速度
（脱皮阻害剤との違い）

Bacillus subtilisを有効成分とした新規微生物殺菌剤 “アグロケア水和剤”について

前田 光紀（本文P29～38）



HAI-0404株



アグロケア水和剤



HAI-0404株のグラム染色結果



HAI-0404株の
インゲン灰色かび
病防除試験結果

無処理



アグロケア水和剤
1000倍



バチルスA剤
1000倍



バチルスB剤
500倍




バチルスC剤
1000倍



バチルスD剤
2000倍




アグロケア水和剤 1000倍



バチルスA剤 1000倍



バチルスB剤 500倍



バチルスC剤 1000倍



バチルスD剤 2000倍

秋田県におけるリンゴ病害防除とダイパワー水和剤

佐藤 裕（本文P1～4）



輪紋病



斑点落葉病



炭疽病



褐斑病

北海道におけるナブ乳剤について

前野 眞司（本文P17～22）



コヌカグサ



シバムギ



イヌビエ



スズメノカタビラ

雲南省訪問記

石井 英夫（本文P50～53）



山あいの日干し煉瓦の家々



昆明近郊のナシ園



イネの収穫風景



ブドウの簡易雨よけ栽培



建水のザク口園



民族衣装を着込んだ麗江の婦人達



麗江の水路と建物



香格里拉のチベット仏教寺院、松贊林寺



碧塔海の湖畔

淡路島におけるネギアザミウマの発生と防除対策

二井 清友（本文P5～8）



外葉の被害



結球部の被害（カルス状に）



食害部からの黒化