




「コムギ赤かび病」



「紅色雪腐病」(相馬・原図)




「チオファネートメチル耐性検定」



「コムギ赤かび病の穂の症状」



「*M. nivale* の分生胞子」(相馬・原図)




「*F. graminearum* の分生胞子」(相馬・原図)



「*M. nivale* による赤かび病被害粒」
被害粒(上)と健全粒(下)(小澤・原図)



「*F. graminearum* による赤かび病被害粒」
被害粒(上)と健全粒(下)(小澤・原図)



フルアジナムの構造式



フロンサイドSC 処理



無処理

孢子発芽に対するフロンサイドの効果 (1ppm)



紋羽病防除 (埋戻し灌注処理)



「モンパ奉行」(灌注器)



「モンパ奉行」処理風景



フロンサイドSC の根こぶ病防除風景 (ブームスプレーヤー)



飼料畑に侵入するイチビ



圃場一面に蔓延するアレチウリ



トウモロコシより生育が速いオオブタクサ




鋭いトゲを持つ多年生有毒雑草ワルナスビ



猛毒のアルカロイドを含有する有毒雑草ヨウシュチョウセンアサガオ

新製品紹介ムッシュボルドー


日本曹達株式会社農業化学品事業部普及グループ(本文P. 31～35)



日曹ムッシュボルドーDFの作用(模式図)



銅剤の温度・湿度と薬害発生傾向



日曹ムッシュボルドーDFの製剤粒子(模式図)

「全国スモモサミットIN南アルプス市」開催される
森谷 修（本文P. 41～42）



サミット宣言・壇上に並ぶ全国のスモモ産地代表



スモモの革命品種「貴陽」

新ロゴ・キャラ紹介 日本曹達株式会社 農業化学品事業部普及グループ広告宣伝チーム



現地視察(落合地区優良園)