

パンチョ®TF 顆粒水和剤

(PANCHO TF WDG)

登録番号 第21117号
 種類名 シルフエナミド・トリフルミゾール水和剤
 cyflufenamid・triflumizole
 殺菌剤分類 U6, 3
 性状 淡褐色水和性細粒
 有効年限 3年

有効成分 シルフエナミド 3.4%、トリフルミゾール 15.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装 (100g×25袋)×2箱

■特長

1. 各種作物のうどんこ病に優れた効果を示す殺菌剤です。特に、有効成分の一つシルフエナミド(一般名)は、うどんこ病に効果が高い新規殺菌剤です。
2. 優れた予防効果のほかに、治療効果も有します。
3. 残効性に優れるため、防除回数の低減につながります。
4. 揮散性と葉内移行性を有します。
5. 既存剤に耐性を発達させたうどんこ病にも、効力を示します。

■適用病害名及び使用方法

(2020年11月25日現在)

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数(倍) | 使用液量(ℓ/10a) | 使用時期 | 本剤の使用回数 | シルフエナミドを含む農薬の総使用回数 | トリフルミゾールを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 | |
|---|-------|---------|-------------|----------|---------|--------------------|---------------------|------|---------------------|
| 麦類 | うどんこ病 | 2,000 | 60～150 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 〔種子粉衣は1回以内〕 | 散布 | |
| いちご、きゅうり すいか、メロン なす、ピーマン トマト、ミニトマト うり類(漬物用) | | | 100～300 | 収穫前日まで | | | 5回以内 | | |
| かぼちゃ | | | 4,000 | 200～700 | | | 収穫7日前まで 収穫14日前まで | | 5回以内 〔種子粉衣は1回以内〕 |
| にがうり | | | | | | | | | 3回以内 |
| ズッキーニ | | | | | | | | | 4回以内 |
| りんご | 灰星病 | 2,000 | - | 3回以内 | | | | | |
| おうとう | | | | 2回以内 | | | | | |
| まさき さるすべり | | | | 2回以内 | | | | | |
| 花き類・観葉植物 | うどんこ病 | 2,000 | 100～300 | - | 5回以内 | 5回以内 | | | |

△ 効果・薬害などの注意

1. 本剤は顆粒がかたまりになって溶けにくくなる場合があるので、薬液調製の際はよく攪拌してください。なお、かたまつた本剤を希釈して使用しても品質および効果に問題はありません。
2. うり類の幼苗期には、濃緑化症状及び生育抑制が生じることがあるので、使用しないでください。
3. 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
4. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
5. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
6. 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

7. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
8. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

●パンチョTF顆粒水和剤の上手な使い方

- ①一般にハウスなどの施設栽培メロンに使用する場合、特にネット系メロンでは、交配2～3日前から交配20日後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の使用はさけてください。また散布後高温が予想される場合は、使用しないでください。