

ブロードワン[®] 顆粒水和剤

(BROADONE WDG)

登録番号 第21034号

種類名 チオファネートメチル・メパニピリム水和剤
thiophanate-methyl・mepanipyrim

殺菌剤分類 1,9

性状 淡褐色水和性細粒

有効年限 4年

有効成分 チオファネートメチル 56.0%、メパニピリム 13.3%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

包装 1 kg×10袋(北海道限定)、500g×20袋(北海道を除く)

■特長

- 幅広い殺菌スペクトラムを有し浸透移行性・予防効果・治療効果を合わせ持つ「トップジン M」と、優れた予防効果と残効性を有する「フルピカ」の混合薬剤です。
- 既存剤に耐性を発達させた灰色かび病にも優れた効果を示します。

最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2022年12月1日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	メパニピリムを含む農薬の総使用回数	使用方法
あずき	炭疽病 灰色かび病	1,000	—	収穫14日前まで	4回以内	5回以内 〔種子への処理は1回以内、 は種後は4回以内〕	5回以内	散布
	菌核病	800～1,000						
いんげんまめ	炭疽病 灰色かび病 菌核病	1,000	100～300	収穫前日まで	4回以内	6回以内 〔種子への処理は1回以内、 は種後は5回以内〕	4回以内	
きゅうり トマト ミニトマト なす	灰色かび病 菌核病	1,500						
レタス								収穫7日前まで

⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意 

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- 散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

殺菌剤 ブロードワン顆粒水和剤

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

○使用量に合わせて薬液を調製し、使いぎってください。空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。