

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の日安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足る知見や経験に乏しい

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁製剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	かんきつ	小麦
アクタラ(SG)	●	
アグロスリン(乳)		●
アドマイヤー(FL)	●	
ウララ50(DF)	●	
エルサン(乳)		●
オマイト(水)	◎	
カネマイト(FL)	●	
コテツ(FL)	◎	
コルト(WG)	●	
コロマイト(水)	◎	
サンマイト(水)	●	
スタークル(SG)	◎	
スプラサイド40(乳)	●	
スミチオン(乳)		●
ダニエモン(FL)	●	
ダニオーテ(FL)	◎	
ダニゲッター(FL)	●	
ダニコング(FL)	○	
ダニサラバ(FL)	●	
ダブルフェース(FL)	○	
ダントツ(溶)	●	
テルスター(水)	●	
テルスター(FL)	●	
トレボン(乳)		●
ハチハチ(FL)	●	
パノコン(乳) ※1	●	
バリュースター(FL)	●	
パロック(FL)	●	
ペイオフME(液)		●
マイトコーネ(FL)	◎	
マブリック20(水)	●	
モスピラン(SG)	●	
モスピランSL(液)	●	
ロディー(乳)	●	
MR. ジョーカー(水)	◎	

※1:[みかん]のみの登録薬剤

殺菌剤	かんきつ	小麦
アミスター20(FL)		●
アリエッティ(水)	●	
サルファーゾル	●	
ジャストフィット(FL)	●	
ストロビー(DF)	×	
石灰硫黄合剤(液) ※2	○	
ナティーボ(FL)	●	
ライメイ(FL)	●	

※2: ベフトップジン(FL)を溶かしてから石灰硫黄合剤を溶かす。

展着剤	かんきつ	小麦
マデック	●	



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
お問合せ (03) 3245-6178
(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)