

予防的な
くん煙で
病害一掃!

身方のひと手間で



しつかり効きます!

日曹 **くん煙殺菌剤**
ダゴニール
ジェット

適用病害と使用方法

作物名	適用場所	適用病害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数	使用方法		
きゅうり	温室、ビニールハウス等密閉できる場所	べと病 うどんこ病	くん煙室容積 100m ³ 〔床面積 50m ² 〕 高さ 2m 当り 20g	収穫前日まで	8回以内	14回以内 〔土壌灌注は2回以内、 散布、常温煙霧、くん煙及び エアゾル剤の噴射は合計12回以内〕	くん煙 通常 〔10~15時間〕		
トマト		葉かび病						4回以内	6回以内 〔土壌灌注は2回以内、 散布、常温煙霧、くん煙及び エアゾル剤の噴射は合計4回以内〕
なす		黒枯病						4回以内	4回以内



日曹ダコニールジェット

ダコニールは(株)エス・ディー・エスバイオテックの登録商標です。

有効成分：T P N 46.0%

殺菌剤分類 **M5**

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装：(80g×5錠)×10パック×2箱

日曹ダコニールジェットの上手な使い方


● 予防(早めの防除)を重点に!

発生前や発生初期から予防的にくん煙することで、優れた防除効果を発揮します。

● ローテーションの1剤として!

本剤の連続使用は可能ですが、他剤の耐性菌対策のためにローテーションの1剤として使用してください。

設置方法 (10アールハウスの場合)



使用薬量の決め方

ハウスの面積	200m ² 約61坪	600m ² 約182坪	1,000m ² 約303坪
ハウスの容積(高さ2mとして)	400m ³	1,200m ³	2,000m ³
使用量(80g)	1錠	3錠	5錠

点火方法



①点火は以下の通りに行なってください。

● 点火紙を用いる場合

同封の点火紙をつり具の所定の位置に正しく設置し、その上に薬剤をのせてから点火紙に点火します。点火紙を薬剤の上のせて点火すると、炎が出るのでさけてください。発煙直後に万一炎が出た場合は吹き消してください。点火後発煙を確認したらくん煙室の外に出て、そのまま放置してください。


〔退室後に炎が出た場合においても、再びくん煙室には入らずに、そのまま放置してください。〕

● 電気式点火・くん煙装置を使用する場合

装置は水などに濡れないように設置し、電源がオフになっていることを確認のうえ、薬剤を装置の所定の位置に正しく設置した後に通電してください。点火後発煙したら電源のオフを確認し、くん煙室の外に出てそのまま放置してください。発煙直後に万一炎が出た場合には、再びくん煙室に入らずに、そのまま放置してください。

②点火後は、くん煙終了時までくん煙室に入らないでください。

きゅうり/べと病に対する効果



効果・薬害等の注意

- 温室・ガラス室・ビニールハウス等、防除しようとする室の戸や窓を閉め、室内の可燃物を取り除き、室の容積によって使用量を決め、必要に応じてくん煙箇所を数箇所に分けて配置し、煙が満げなく行きわたるようにしてください。
- くん煙する場合は、添付のつり具または所定の電気式点火・くん煙装置を使用してくん煙してください。つり具および電気式点火・くん煙装置はつり下げか、または不燃性の台などの上にのせて使用してください。なお、植物体・可燃物から離れた中央の安全な場所に設置してください。特にビニールなどの被覆材とは60cm以上離れた位置で使用してください。
- 高温時のくん煙は薬害を生じる場合があるので日中のくん煙はさけ、夕刻からくん煙し、翌朝開放してください。
- 室外で強い風が吹いている時は、煙が片寄ってしまい、均一な効果が出にくいので使用しないでください。
- 定植直後または幼苗・軟弱徒長苗には使用しないでください。(薬害)
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

- 誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
 - 皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。(刺激性)
 - 夏期高温時の使用をさけてください。
 - 点火などの作業の際は、農業用マスク、手袋などを着用してください。また煙を吸い込んだり、薬剤に直接接触したりしないよう注意し、作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - かぶれやすい体質の人は、作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
 - 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
 - くん煙中はハウス内に入らないでください。また、くん煙終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室してください。
- 魚毒性等:水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、施設内に水産動植物を飼っている水槽などを置かないでください。空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管:密封し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

本資料は2022年7月現在の登録内容に基づいています。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)



最新の登録内容