

# ハダニ防除に 新たな一手!☆



きゅうり、ピーマン、  
メロン、ぶどう、  
もも、ネクタリンに  
適用拡大!!



殺ダニ剤

# ダニオーテ<sup>®</sup>フロアブル



日本曹達株式会社

# ダニオーテ<sup>®</sup>フロアブル

有効成分：アシノナビル……20.0%

殺虫剤分類 33

人畜毒性：普通物  
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

## 特長

- ★新規の作用機構を有する殺ダニ剤で既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。
- ★各種ハダニ類の全ステージに活性を示します。
- ★気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。
- ★天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
- ★作物に対する安全性が高い薬剤です。

### △ 銅剤との混用・近接散布についての注意点

★銅剤との混用ができません。銅剤散布10日以上前にご使用ください。銅剤を散布した後は本剤の散布をさけてください。

銅剤  混用

ダニオーテ



銅剤

銅剤



ダニオーテ

10日間以上

## 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アシノナビルを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	2,000~3,000	200~700	収穫前日まで	1回	散布	1回
りんご	ハダニ類	1,000~2,000					
なし、おうとう ぶどう、もも ネクタリン 小粒核果類		2,000			2回以内		2回以内
いちご、なす きゅうり、ピーマン メロン、すいか					100~300		
茶	カンザワハダニ	200~400	200~400	摘採14日前まで	1回	1回	
花き類・ 観葉植物	ハダニ類	100~300	100~300	発生初期	2回以内	2回以内	

## 殺ダニス펙トル

◎：優れた効果が認められる  
×：効果が認められない

科目	属名	種名	効果
ハダニ科	Tetranychus属	ナミハダニ	◎
		カンザワハダニ	◎
	Panonychus属	ミカンハダニ	◎
		リンゴハダニ	◎
フシダニ科	Aculops属	ミカンサビダニ	×
ホコリダニ科	Polyphagotarsonemus属	チャノホコリダニ	×

## 影響が認められなかった有用生物・天敵 (IOBC基準による)

- ★セイヨウミツバチ
- ★クメリスカブリダニ
- ★クロマルハナバチ
- ★チリカブリダニ
- ★マメコバチ
- ★タイリクヒメハナカメムシ
- ★ヒロズキンバエ
- ★タバコカスミカメ
- ★ミヤコカブリダニ
- ★コレマンアブラバチ
- ★スワルスキーカブリダニ
- ★アカメガシワクダアザミウマ
- ★リモニカスカブリダニ
- ★オンシツツヤコバチ



ハダニ類に高い防除効果を示します  
(サビダニ類、ホコリダニ類には効果が期待できません)

### △ 効果・被害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は次の事項に注意してください。
  - ①銅剤との混用はさけてください。
  - ②本剤を散布した後に銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください。
  - ③銅剤を散布した後は本剤の使用をさけてください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないよう葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- カラー、花はすに使用する場合は、湿水状態で使用しないでください。また、使用


後14日間は入水しないでください。

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

### △ 安全使用上の注意

- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
  - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
  - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 保管：直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

 **日本曹達株式会社**  
〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
お問合せ (03) 3245-6178  
(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)



最新の登録内容  
SDSはこちら



特長編(動画)

※本資料は2023年2月現在の登録内容に基づいています。