



にんじん



やまのいも



いんげんまめ



だいず



たまねぎ



てんさい



あずき



えだまめ

頑固なスズメノカタビラもこの通り

ホーネスト  
処理



無処理



効果  
完成



主な適用雑草 スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ノビエ、  
メヒシバ、エノコログサ


出てから  
まいてね。  
(雑草生育期処理)



カタビラだって  
除草しちゃうぞ！

生育期のイネ科雑草防除に！

ホーネスト<sup>®</sup> 乳剤





## ■特長

1. イネ科雑草（スズメノカタビラを含む）に優れた殺草効果を発揮します。
2. 「だいす」はイネ科雑草10葉期まで、幅広く散布できます。（スズメノカタビラは5葉期まで）
3. 登録作物にかかっても影響はありません。
4. 浸透移行性に優れ、根まで枯らします。
5. 散布後に薬液が乾けば、降雨の影響はほとんどありません。

## ■適用作物・雑草と使用方法


作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	本剤およびテブラロキシジムを含む農薬の総使用回数		
			薬量	希釈水量				
だいす	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草6~10葉期)	75~100 ml/10a	100ℓ/10a	雑草茎葉散布 または 全面散布	1回		
あずき	一年生イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期)					100~150 ℓ/10a	2回以内
いんげんまめ		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期)						
えだまめ		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期)						
たまねぎ		雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期)						
にんじん やまのいも	雑草生育期 (イネ科雑草3~5葉期)	1回						
てんさい	一年生および 多年生イネ科雑草		雑草生育期 (イネ科雑草6~8葉期)	100ℓ/10a				

## 散布適期と 使用薬量


- イネ科雑草3~5葉期に75~100ml/10a散布
- だいすはイネ科雑草3~10葉期に75~100ml/10a(スズメノカタビラは3~5葉期)

## ■試験成績

### ●たまねぎ



### ●だいす



## ⚠️効果・薬害等の注意(抜粋)

- 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10日(スズメノカタビラは2~3週間)を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。
- 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合は、効果が劣ることがあるので使用をさけてください。
- 自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 周辺のイネ科作物にかかるおそれがあるので、注意して散布してください。
- アブラナ科野菜の一部に薬害を生じる場合があるので、飛散には十分注意してください。

## ⚠️たまねぎに使用する際の注意事項

たまねぎに使用する場合、本剤は単用で使用してください。特に、葉面散布肥料の混用または葉面散布肥料使用後の散布では、たまねぎの葉に薬害(癒着)を生じる場合がありますので、さけてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記帳しましょう。

※本資料は2019年5月現在の登録内容に基づいています。



# 日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
 ☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084  
<https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>