

落葉果樹防除の決め手は越冬した病原菌の密度を下げることが大事

# 病原菌の拡散をがっちりガード!



休眠期防除剤

# ホマイコート<sup>®</sup>

● 適用病害と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チウラムを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
な し	黒星病	50倍	200~700 ℥ / 10a	休眠期	1 回	散 布	5 回以内 (休眠期は1回以内)	11回以内 〔塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以内、 灌注は1回以内、 生育期の散布は6回以内〕
	うどんこ病 炭疽病	50~100倍 50倍					2 回以内 (休眠期は1回以内)	10回以内 〔塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以内、 生育期の散布は6回以内〕
も も	縮葉病		50~100倍	休眠期	1 回	散 布	5 回以内	
すもも	ふくろみ病						3回以内	6回以内 〔塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以内、 生育期の散布は3回以内〕
ぶどう	黒とう病 晚腐病 つる割病		50倍	休眠期	1 回	散 布	3回以内 (休眠期は1回以内、 (生育期は2回以内)	5回以内 〔塗布は3回以内、 休眠期の散布は1回以内、 生育期の散布は1回以内〕
	枝膨病							

本剤は、稻・大麦・きゅうり・アスター・けいとう・べにばな・チューリップ・すいせん・グラジオラスの種子や球根消毒剤として登録があります。



日本曹達株式会社

落葉果樹防除の決め手は越冬した病原菌の密度を下げる事が大事

# 病原菌の拡散をがっちりガード！

休眠期防除剤

# ホーマイコート

■有効成分：チウラム……………10.0%  
チオファネートメチル……10.0%  
■人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

## 特長

- トップジンMの浸透性と治療効果、チウラムの残効性と保護効果を兼ね備え、さらに固着性の良い製剤にしているので、**病原菌の拡散をがっちりガードします。**
- 金属(針金等)の腐食の心配がありません。

## 上手な使い方

- 休眠期の散布は、病原菌の活動が始まる**萌芽前の散布が効果的です。**
- 石灰硫黄合剤を散布後、ホーマイコートを散布する場合、**2週間以上あけてください。**

### ■ ホーマイコート50倍液散布試験(日本曹達・小田原研究所)

ステージ	作物名	ぶどう	なし	かき	もも	薬害
萌芽前						—
萌芽初期						—

※萌芽初期に薬剤がかかっても薬害の心配はありません。

### △ 使用上の注意事項(抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 蚊に対して影響があるので、周辺の桑葉にはからないようにしてください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

### △ 安全使用上の注意



- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗いし、眼科医の手当を受けてください。
- 皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 薬液調製時及び使用の際は、保護マネ、防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は、他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。

#### 水産動植物への影響

水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

包 装：1kg×10袋

保 管

密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

(本資料は、2017年4月現在の登録内容に基づいています)

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

☎ (03)3245-6178 FAX(03)3245-6084

ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>

大阪支店 ☎ (06)6229-7343 関東営業所 ☎ (048)677-6010

札幌営業所 ☎ (011)241-5581 名古屋営業所 ☎ (052)238-0003

仙台営業所 ☎ (022)227-1741 福岡営業所 ☎ (092)771-1336

信越営業所 ☎ (0255)81-2323 松山営業所 ☎ (089)931-7315