

頼りになる強力殺ダニ剤

農林水産省登録  
第16094号

# ニッソラン<sup>®</sup>水和剤

有効成分：ヘキシチアゾクス……………10.0%

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

果樹・野菜・花のハダニ防除に

## 特長

- 本剤は殺卵力が強く、残効性に優れます。
- 各種作物に薬害の心配が少ない薬剤です。
- 各種のハダニ類に対し、低濃度で優れた効果があります。
- 有益昆虫・天敵類に影響が少ない薬剤です。




日本曹達株式会社



## 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤及びヘキシチアゾクスを含む農薬の総使用回数	使用方法
かんきつ	ミカンハダニ	2,000~4,000	200~700	収穫7日前まで	2回以内	散布
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	2,000~3,000			1回	
なし・ぶどう	ハダニ類	2,000~3,000	100~300	収穫前日まで	2回以内	
もも・おうとう・かき						
うめ						
びわ・いちじく						
いちご・なす・きゅうり にがうり・ピーマン さやえんどう・実えんどう						
さやいんげん						
未成熟ぶじまめ		2,000	収穫14日前まで			
未成熟さざげ・ししとう		3,000	収穫前日まで			
えだまめ		2,000~3,000	収穫21日前まで			
あずき			収穫14日前まで			
だいず・てんさい		2,000	収穫7日前まで			
かんしょ			収穫前日まで			
かぼちゃ・すいか	収穫3日前まで					
メロン	2,000~3,000	200~700	収穫7日前まで			
ホップ			収穫21日前まで			
食用ぎく	3,000	100~300	収穫14日前まで	1回		
しそ			収穫60日前まで	2回以内		
しそ(花穂)	2,000	2,000~3,000	—	—		
さんしょう(葉)	2,000~3,000		—	—		
花き類・観葉植物	2,000~3,000	—	—	—		

## 圃場での効力発現モデル



### ⚠ 効果・薬害等の注意

- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に、かけ残しのないようにていねいに散布してください。
- 薬剤抵抗性発達回避のため、本剤の散布は年1回とし、作用性の異なる他の薬剤の輪番で使用してください。  
(本剤と、カーラとは、類似した作用性の成分を含む薬剤です。)
- 本剤は殺卵力、殺幼虫力は強いですが、成虫に対する効果が乏しく、効果の発現には夏期で3~7日、春秋期の低温期では7~10日を要することがありますので、十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 粉末は、眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗いしてください。  
保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して小児の手の届かない、冷涼・乾燥した所に保管してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し、水・消火剤などで消火に努めてください。
- 漏出時は保護具を着用し、掃き取り回収してください。
- 移送取り扱いは、ていねいに行ってください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

包装:(100g×25袋)×4箱、500g×20袋

※本資料は、2012年6月現在の登録内容に基づいています。



## 日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084

ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>  
大阪支店 ☎(06)6229-7343 東京営業所 ☎(03)3279-6961  
札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003  
仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336  
信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315