


果樹・野菜・茶・花のハダニ防除に!

ガブリー発! 適用拡大!

さといもに
適用拡大となりました!



ハダニの全ステージで速く効く

日曹

ピラニカ® EW

ピラニカ®は日本農薬(株)の登録商標です。



ハダニの全ステージで速く効く——
日曹 **ピラニカ** EW

®は日本農薬(株)の登録商標です。

農林水産省登録 第18345号

有効成分：テブフェンピラド…10%

毒 性：医薬用外劇物

■適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本 剤 及 び テブフェンピラド を含む農薬の 総 使 用 回 数	使用 方法
な す	チャノホコリダニ	2,000	150～300	収穫前日まで	1回	散布
	ハダニ類	2,000～ 3,000			2回以内	
い ち ご	アブラムシ類 うどんこ病	2,000		収穫3日前まで		
す い か	ハダニ類	2,000～3,000	収穫14日前まで 収穫30日前まで			
メ ロ ン		1,000～ 2,000		200～700		
も も			2,000～3,000		収穫前日まで	
おうとう		アブラムシ類		2,000		
きゅうり	カンザワハダニ		200～400		摘採21日前まで	
さといも	ハダニ類	200～700		発生初期		
あ ず き	カンザワハダニ		150～300		発生初期	
茶	チャノミドリヒメヨコバイ	1,000		発生初期		
	しきみ		サビダニ類		200～700	
花き類・観葉植物 (カーネーション・きくを除く)	ハダニ類	2,000	150～300	発生初期		
カーネーション	アブラムシ類	1,000～ 2,000			発生初期	
き く		ハダニ類	2,000	発生初期		
や な ぎ	チャノホコリダニ	2,000	発生初期		1回	
ほおずき	ハダニ類	2,000		発生初期		

■特長

1. 各種ハダニに優れた効果

ナミハダニ・カンザワハダニなど、ハダニの種類を問わず優れた効果を発揮します。

2. ハダニの全発育ステージに高い効果

ハダニの卵・幼虫・若虫・成虫の、すべてのステージに高い効果を発揮します。

3. 優れた速効性

ハダニ類に対して速効的に効果を発現します。

4. 安定した効果

気温の影響を受けることなく、いつでも安定した効果を発揮します。

5. 有益昆虫に影響が少ない

ミツバチ・マルハナバチなど、有益昆虫に対する影響が少ない薬剤です。

6. 各種の殺菌剤・殺虫剤との混用が可能です。

7. 作物に対する薬害の心配が少ない薬剤です。



水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。



△効果・薬害等の注意

- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番(ローテーション)で使用してください。
- バラの新展開葉に薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
- さつきに薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

△安全使用上の注意

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布液調製時及び散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★小児の手の届く所には置かないでください。
★使用後の空容器等は圃場などに放置せずに適切に処理してください。

※この資料は2019年6月現在の知見に基づき作成したものです。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084
<https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>