

合成ピレスロイド系殺虫剤

農林水産省登録
第17253号

日曹

スカウト®



フロアブル

有効成分:トラロメリン1.4% 人畜毒性:医薬用外劇物

®はバイエルグループの登録商標



果樹・野菜などの広範囲の害虫防除に
少薬量で大きな効果



日本曹達株式会社



●適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及びトフロメトリンを含む農薬の総使用回数	使用方法	
りんご	ハマキムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類	2,000	200~700 ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	
	アブラムシ類、キンモンハモグリガ、カメムシ類	1,500~2,000					
おうとう	ショウジョウバエ類、オウトウハマダラミバエ	3,000					2回以内
	オウトウショウジョウバエ						
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ、ヒロヘリアオイラガ	1,500					5回以内
	カメムシ類						
なし	アブラムシ類	1,500~2,000					3回以内
	ナシチビガ、シンクイムシ類	2,000					
もも	アブラムシ類	2,000~3,000					3回以内
	モモハモグリガ、シンクイムシ類	2,000					
ネクタリン	アブラムシ類	2,000~3,000		3回以内			
	シンクイムシ類	2,000					
すもも	アブラムシ類	2,000~3,000		3回以内			
	カメムシ類	2,000					
うめ	アブラムシ類	2,000~3,000		1回			
	カメムシ類	2,000					
小粒核果類(うめ、すももを除く)	アブラムシ類	2,000~3,000		5回以内			
	カメムシ類	1,500					
かき	アザミウマ類	2,000		5回以内			
	カキノヘタムシガ	1,500~2,000					
ぶどう	ハマキムシ類、コガネムシ類成虫	2,000	3回以内				
	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ	2,000~3,000					
いちじく	アザミウマ類	2,000	3回以内				
	アブラムシ類、ビロキジラミ						
びわ	アブラムシ類	1,500~2,000	3回以内				
	キイロマイコガ						
キウイフルーツ	アブラムシ類	2,000~4,000	5回以内				
	キイロマイコガ						
かんきつ(みかんを除く)	チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ	2,000	5回以内				
	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ						
みかん	アブラムシ類	1,500~3,000	3回以内				
	タマナギンウツバ、ハイマダラノメイガ						
はくさい	アブラムシ類	2,000	5回以内				
	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ						
キャベツ	アブラムシ類	1,500~3,000	3回以内				
	タマナギンウツバ、ハイマダラノメイガ						
レタス	アブラムシ類	1,500~3,000	3回以内				
	アブラムシ類						
アスパラガス・にんじん	ヨトウムシ	2,000	2回以内				
	ヨトウムシ						
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイを除く)	ヨトウムシ	2,000	3回以内				
	ヨトウムシ、カブラハバチ、アブラムシ類						
チンゲンサイ	ヨトウムシ、カブラハバチ	2,000	3回以内				
	ナガイモコガ						
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ	2,000	2回以内				
	ナガイモコガ						
やまのいも	ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ	2,000	2回以内				
	ヨトウムシ						
ブロッコリー	ヨトウムシ	3,000	4回以内				
	オンシツコナジラミ						
なばな類	アブラムシ類	2,000~3,000	3回以内				
	アブラムシ類	1,500~3,000					
なす	アブラムシ類	2,000	5回以内				
	アブラムシ類	2,000~3,000					
すいか・メロン	アブラムシ類	2,000	2回以内				
	アブラムシ類	2,000~3,000					
たまねぎ	アブラムシ類	1,500	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					
さやえんどう・実えんどう	アブラムシ類	1,500	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					
ばれいしよ	アブラムシ類	1,500	3回以内				
	アブラムシ類	3,000					
しょうが	アブラムシ類	2,000~3,000	3回以内				
	アブラムシ類	2,000~3,000					
芝	シバツトガ、スジキリヨトウ	1,500	発生初期				
	シバツトガ、スジキリヨトウ	200~300ml/m ²					
茶	シバツトガ、スジキリヨトウ	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで				
	シバツトガ、スジキリヨトウ	200~400ℓ/10a					
花き類・観葉植物(宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く)	アブラムシ類	2,000~3,000	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					
グラジオラス、トルコギキョウ	アザミウマ類	2,000~3,000	5回以内				
	アザミウマ類	2,000					
宿根かすみそう	アブラムシ類	2,000~3,000	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					
りんどう	アブラムシ類	2,000~3,000	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					
つつじ類	アブラムシ類	2,000~3,000	5回以内				
	アブラムシ類	2,000					

散布液調製法 スカウトフロアブルは粘性があるので、あらかじめ少量の水でよく溶かしてから、所定量の水に溶かし、よく攪拌してください。ポルドー液と混用する場合は、必ず本手順を守ってください。

⚠️ **効果・薬害などの注意**

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- りんごのキンモンホソガの防除に使用する場合、幼虫期では効果が劣るので成虫最多発生期に散布するよう特に留意してください。
- かんきつ・茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので、注意してください。
- 蜜に対しては長期間毒性があるので、桑葉にかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らない

ように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠️ **安全使用上の注意**

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の担当を受けさせてください。使用中に身体の異常を感じた場合には、直ちに医師の担当を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の担当を受けてください。
- かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんで

よく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 街路、公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

治療法:動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。

水産動植物への影響:水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また空容器等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管:密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

(※本資料は、2019年11月現在の登録内容に基づいています。)



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
 ☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084
<https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>