

大豆・麦などの、病害虫同時防除に…

日曹 スミトツプ[®]M 粉剤

有効成分:MEP 3.0%、チオファネートメチル 2.0%
人畜毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



紫斑病



アオクサカメムシ



ホソヘリカメムシ



マメシンクイガ



シロイチモジマダラメイガ

品質を高める…



赤かび病



うどんこ病



ムギアカタマバエ



被害穂

健全




日本曹達株式会社

■適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数	使用方法
小麦	赤かび病 うどんこ病 ムギアカタマバエ アブラムシ類 ヒメビウンカ	4	収穫14日前まで	1回	1回	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布および無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)	散布
麦類 (小麦を除く)						3回以内 (種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内)	
だ い ず	紫斑病 マメシクイガ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ シロイチモジマダラメイガ	3~4	開花期~ 若莢期 ただし、収穫 21日前まで	4回以内	4回以内	4回以内 (種子への処理は1回以内)	
つつじ類	褐斑病 ツツジグンバイ	4	—	5回以内	6回以内	5回以内	

■上手な使い方


大豆



- 紫斑病と子実害虫を同時に防除できます。
- 開花期～若莢期に10日間隔で3回程度散布してください。
- 散布機などを用い、葉裏にも十分かかるように散布してください。


← 使用時期 →

(開花期) (若莢期)



スミトップM粉剤
3~4kg/10アール


麦



- 赤かび病・うどんこ病・ムギアカタマバエなどを同時に防除できます。
- 出穂期～穂揃期に散布してください。

← 使用時期 →

(出穂期) (穂揃期)



スミトップM粉剤
4kg/10アール

△効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせて秤量し、使いきってください。
- だいずに対しては適用病害虫の同時防除剤として使用し、開花期～若莢期に2～3回散布してください。
- あぶらな科作物には薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - (1)ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
 - (2)受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - (3)関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 使用の際は使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△安全使用上の注意

- MEPの解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されています。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。

- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 散布の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は、作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 自動車・壁などの塗装面・大理石・御影石に薬剤がかかると変色するおそれがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や使用に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや、立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物への影響

水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋など水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管

密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に、保管してください。

包装

3kg×8袋、20kg×1袋

「スミトップ」は住友化学工業(株)の登録商標です。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084
<https://www.nippon-soda.co.jp/nougoy/>

No.265-1910S

本資料は、2019年10月現在の登録内容に基づいています。