

モンセレン[®] 顆粒水和剤

(MONCEREN WDG)

登録番号 第20067号
 種類名 ペンシクロン水和剤
 pencycuron
 殺菌剤分類 20
 性状 褐色水和性細粒
 有効年限 4年

有効成分 ペンシクロン 50.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装 1 kg×10袋

■特長

1. 根腐病と葉腐病をおこすリゾクトニア菌に対し、優れた効果を示します。
2. 残効性が長いので、根腐病と葉腐病に対し、安定した効果が期待できます。
3. 定植前の苗床灌注と本圃の体系防除で、優れた効果を発揮します。
4. 根腐病防除は発病させないことが重要です。予防効果に優れるモンセレンが最適です。



最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2022年12月21日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペンシクロンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	黒あざ病	100 ～200	-	植付前	1回	瞬時～10分間 種いも浸漬	1回
てんさい	葉腐病	1,000	100～300 ℓ/10a	収穫30日 前まで	4回以内	散布	4回以内 灌注は 1回以内
	根腐病	200	ペーパーポット 1冊当たり1ℓ (3ℓ/m ²)	定植前	1回	灌注	

△ 効果・薬害などの注意

1. ばれいしょに使用する場合、処理した種いもはよく風乾してから植付けてください。
2. 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

3. 粉末は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
4. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
5. 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

水産動植物への影響：浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。