



白さび病の病徴1
葉裏の白色粉塊



白さび病の病徴2
葉表の黄白色の円形状斑紋と白色小斑点



ダイコンわっか症

岩手県におけるキュウリべと病防除とピシロックフロアブル

岩館 康哉 (本文P.5～10)



キュウリべと病

夏秋キャベツ栽培で発生するキャベツべと病に対するピシロックフロアブルの防除効果について

三國 和彦 (本文P.11～13)



葉の表面のべと病の症状



葉の裏面のべと病の症状

クビアカツヤカミキリの徳島県内における被害状況と防除対策について

中野 昭雄 (本文P.30～34)



クビアカツヤカミキリ雄成虫



モモ樹に産下された
クビアカツヤカミキリ卵



クビアカツヤカミキリ幼虫の
フラスが排出されたモモ樹



様々な生育ステージの
クビアカツヤカミキリ幼虫




輪切りしたモモ被害樹

ベルコートフロアブルによるタマネギ灰色腐敗病の防除

児玉 不二雄 (本文P.20～24)



立毛中のタマネ
ギ葉への感染



鱗茎全体に密
生した分生子



タマネギ表面の灰緑色のかび
(菌糸, 分生子)(野津原図)



タマネギ内部に拡大(野津原図)




黒褐色の団塊状の菌核(野津原図)



作用特性（コナガへの効果発現速度）



作用特性（ハスモンヨトウへの効果発現速度）



チョウ目害虫のステージ別効果

新製品紹介 ピシロックフロアブル（本文P.46～47）
新製品紹介 アクセルキングフロアブル（本文P.48～49）



アラカルト

（本文P.54～55）



米国の国鳥＝ハクトウワシ



25セント貨幣



State Quarters



収集した State Quarters