

2023年3月22日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2023年3月22日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トリフミン水和剤」

(農林水産省登録 第16300号)

【変更内容の概要】

1. 作物名「ぶどう」に適用病害名「褐斑病」(2000倍、散布)を追加。
2. 作物名「いちご」に適用病害名「輪斑病」(3000倍、散布)を追加。
3. 作物名「メロン」及び「すいか」に適用病害名「つる枯病」(3000倍、散布)を追加。
4. 作物名「トマト」及び「ミニトマト」に適用病害名「うどんこ病」(3000倍、散布)を追加。
5. 作物名「かんしょ」に適用病害名「つる割病」(500倍、17時間苗基部浸漬)を追加。
6. 作物名「ねぎ」の使用方法「苗床灌注」に希釈倍数「100倍」、使用液量「セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5L)当り0.5L」を追加。

【適用病害名・使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリフルミゾール を含む農薬の 総使用回数
ぶどう	うどんこ病	2,000～ 3,000	200～700	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	黒とう病 褐斑病	2,000					
いちご	じゃのめ病 輪斑病	3,000	100～300	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
	うどんこ病	3,000～ 5,000					
メロン	陥没病 つる枯病	3,000	100～300	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
すいか	つる枯病	3,000～ 5,000					
	うどんこ病		3,000～ 5,000				

— 次ページに続く —

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリフルミゾール を含む農薬の 総使用回数
トマト ミニトマト	葉かび病	3,000～ 5,000	100～300	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内
	すすかび病 うどんこ病	3,000					
ねぎ	萎凋病	50	—	定植直前	1回	5～30分間 苗根部浸漬	1回
		100	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット 1冊(30×60cm、 使用土壌約5L) 当り0.5L	定植前		苗床灌注	
		200	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット 1冊(30×60cm、 使用土壌約5L) 当り1L				
かんしょ	基腐病	16	0.8～ 1.6	収穫前日 まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (植付前の処理 は1回以内、 植付後は 2回以内)
		2,000～ 3,000	100～300			散布	
	つる割病	500	—	植付前	1回	17時間 苗基部浸漬	

以上

札幌営業所 (北海道)

TEL: 011-241-5581

仙台営業所 (東北)

TEL: 022-227-1741

関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)

TEL: 048-677-6010

大阪支店 (東海、近畿、中国、四国、福井)

TEL: 06-6229-7343

福岡営業所 (九州、沖縄)

TEL: 092-771-1336