

殺虫剤

フェニックス®

顆粒水和剤

効き目が長いから「安心」!!



アオムシ

ハスモンヨトウ

オオタバコガ

ハイマダラノメイガ

野菜・果樹のチョウ目害虫防除に!

適用拡大!

作物名: おうぎ

無人航空機散布

はくさい、レタス、
非結球レタス、
ねぎ、てんさい

キャベツ、
ブロッコリー
/20倍(2ℓ/10a)



写真はイメージです

2023年3月適用拡大

適用病害虫および使用方法

〈2023年4月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数
もも、ネクタリン	ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、 ケムシ類	4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
おうとう	ハマキムシ類						2回以内
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	ケムシ類						3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
うめ							2回以内
すもも	シンクイムシ類、ケムシ類	4000~6000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
なし	ハマキムシ類、シンクイムシ類、ケムシ類						2回以内
りんご	ハマキムシ類						2回以内
	ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、 ヨモギエダシャク、シンクイムシ類、ケムシ類						2回以内
ぶどう	ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類	4000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (樹幹散布は1回以内、 散布は2回以内)
かき	カキノヘタムシガ、イラガ類			収穫7日前まで			2回以内
かんきつ	ミカンハモグリガ、ハマキムシ類、ケムシ類、アゲハ類			収穫前日まで			3回以内
キウイフルーツ	ハマキムシ類			収穫7日前まで			3回以内
キャベツ	ヨトウムシ、オオタバコガ、アオムシ、コナガ、 ハスモンヨトウ、ウババ類	16倍	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機 による散布	4回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計3回以内)
		20倍	2ℓ/10a				3回以内
		32倍	3.2ℓ/10a				3回以内
	ヨトウムシ、オオタバコガ、アオムシ、コナガ、 ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ウババ類	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
メキャベツ	アオムシ、コナガ、ウババ類	2000倍	200ℓ/10a				2回以内
はくさい	オオタバコガ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、 ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
		20倍	2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
カリフラワー	コナガ、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a				2回以内
	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
		20倍	2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		32倍	3.2ℓ/10a				2回以内
ブロッコリー	ヨトウムシ、コナガ、ハスモンヨトウ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a				2回以内
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	コナガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
チンゲンサイ	コナガ、ハスモンヨトウ	2000~4000倍	100~ 300ℓ /10a				2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
レタス		20倍	2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a				2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
非結球レタス		20倍	2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内 (灌注は1回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a				2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ、ネギコガ	20倍	2ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内
		2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a				2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				3回以内
かぶ	ハイマダラノメイガ、コナガ	2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	無人航空機 による散布	3回以内
		2000~4000倍	100~ 300ℓ/10a				2回以内
		16倍	1.6ℓ/10a				3回以内

→裏面につづく



日本曹達株式会社

2023年3月適用拡大

適用病害虫および使用方法

〈2023年4月現在の登録内容〉

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルベンジアミドを含む 農薬の総使用回数	
そば	ハスモンヨトウ	2000～6000倍	100～ 300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
とうもろこし、 ヤングコーン	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ アワノメイガ、オオタバコガ	2000～4000倍 32倍	3.2ℓ/10a	収穫前日まで				無人航空機による散布
だいこん	ハイマダラノメイガ、コナガ	2000～4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前まで		1回		1回
はつかだいこん	コナガ	2000倍		2回以内	2回以内			
きゅうり、にがうり	ハスモンヨトウ、ウリノメイガ	2000～4000倍		3回以内	3回以内			
すいか	ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、オオタバコガ			2回以内	2回以内	2回以内		
メロン	ウリノメイガ、オオタバコガ							
かぼちゃ、ごぼう、ばれいしょ、 さといも、オクラ、セルリ	ハスモンヨトウ							
なす	ハスモンヨトウ、オオタバコガ アズキノメイガ			4000倍	3回以内	3回以内		
トマト、ミニトマト、いちご	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	2000～4000倍		収穫前日まで				
ピーマン、とうがらし類	オオタバコガ							
にんじん	ヨトウムシ							
かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ	16～32倍 2000～6000倍	0.8～1.6ℓ/10a	2回以内	無人航空機による散布	2回以内		
	ヒルガオハモグリガ	6000倍	100～ 300ℓ /10a		散布			
やまのいも	ナガイモコガ、ハスモンヨトウ	2000～4000倍	3.2ℓ/10a		無人航空機による散布			
やまのいも(むかご)		32倍 2000～4000倍	100～300ℓ/10a		無人航空機による散布			
てんさい	ヨトウムシ	40倍 50倍 5000～6000倍	1.6ℓ/10a 2ℓ/10a		収穫14日前まで	散布	3回以内	
				収穫前日まで	無人航空機による散布			
はすいも(葉柄)、みょうが(花穂)	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	3回以内	散布	3回以内		
しそ			収穫7日前まで	無人航空機による散布				
しそ(花穂)、バジル			収穫3日前まで					
しょうが	アワノメイガ、ハスモンヨトウ	32倍 2000～4000倍	3.2ℓ/10a	2回以内	2回以内	2回以内		
しよくようほおずき、 豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやいんげん、 さやえんどうを除く)	ハスモンヨトウ	2000倍	収穫前日まで				3回以内	3回以内
食用金魚草		4000倍	収穫7日前まで					
食用ミニパラ			収穫前日まで					
きく(葉)			収穫14日前まで					
みょうが(茎葉)		2000倍	100～ 300ℓ /10a	*	3回以内	3回以内		
アスパラガス	オオタバコガ、ヨトウムシ	2000～4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	2回以内		
さやいんげん	ハスモンヨトウ アズキノメイガ	4000倍					2回以内	
さやえんどう	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000～4000倍						
えだまめ	2000倍							3回以内
だいず	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ						収穫7日前まで	2回以内
あずき	ヨトウムシ、アズキノメイガ	2000～6000倍		2回以内	2回以内			
おうぎ	ヨトウムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	6回以内 (1年間に 3回以内)	6回以内 (1年間に 3回以内)		
茶	チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ、チャハマキ、 ヨモギエダシヤク、ハスモンヨトウ		200～ 400ℓ /10a	摘採7日前まで	1回	1回		
みしまさいこ	ハスモンヨトウ		100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
花き類・観葉植物 (きく・りんどうを除く)	オオタバコガ、ハスモンヨトウ			発生初期	4回以内			
きく	オオタバコガ ハスモンヨトウ						2000～4000倍	
りんどう	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、リンドウホソハマキ	2000倍						

*みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで



●植物体への浸透移行性による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。 ●ぶどうの幼果期から果粒肥大期に使用する場合は、果粉の溶脱が生じるおそれがあるので注意してください。 ●西洋なしの品種「レッチェ」では落花後から袋かけ前までの散布についてはリング状の葉斑が生じるおそれがあるので使用をさけてください。 ●畜に対して影響があるため、周辺の桑葉に散布がかわらないようにしてください。 ●無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。 ①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。 ②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。 ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分点検を行ってください。 ④散布薬液の飛散によって自動車やオートマトンの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域周辺の諸物件に十分留意してください。 ⑤機体終了後は次の項目を守ってください。 a)使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。 b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。 ●適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。 ●眼に対して刺激性があるのに眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。 ●水産動物群(中核種)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等の飛散、流入しないよう十分に注意して使用してください。 ●無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないように特に注意してください。 ●散布器具及び器容の洗浄は、お水等に流さないでください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。

●ラベルの記載以外には使用しないでください。

●本剤は小児の手の届く所に置かないでください。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問い合わせ (03) 3245-6178

(平日9～12時、13～17時、土日祝祭日を除く)



最新の登録内容
SDSはこちら