

日曹ピラニカ[®]EW
PYRANICA

登録番号 第18345号
種類名 テブフェンピラド乳剤
tebufenpyrad
殺虫剤分類 21A
性状 類白色乳濁液体
有効年限 3年

有効成分 テブフェンピラド 10.0%

毒性 医薬用外劇物

包装 500mℓ×20本

■特 長

1. ハダニの種類を問わず優れた効果を発揮します。
2. ハダニの卵・幼虫・若虫・成虫の、すべてのステージに高い効果を発揮します。
3. ハダニ類に対して速効的に効果を発現します。
4. 気温の影響を受けることなく、いつでも安定した効果を発揮します。
5. ミツバチ・マルハナバチなどの有益昆虫に対する影響が少ない薬剤です。



最新の登録内容、
SDS はこちら

■適用害虫名及び使用方法

(2023 年 8 月 2 日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ /10a)	使用時期	本剤及びテブ フェンピラドを含む 農薬の総使用回数	使用方法	
いちご	うどんこ病 アブラムシ類	2,000	150 ～ 300	収穫前日まで	2 回以内	散 布	
なす	ハダニ類	2,000 ～ 3,000					収穫 3 日前まで
	チャノホコリダニ	2,000		収穫前日まで			
すいか	ハダニ類	2,000 ～ 3,000			収穫前日まで		
メロン							
きゅうり	アブラムシ類	2,000					
さといも	カンザワハダニ						
茶	カンザワハダニ	1,000 ～ 2,000	200 ～ 400	摘採21日前まで	1 回		
	チャノミドリヒメヨコバイ コミカンアブラムシ	1,000					
もも	ハダニ類	1,000 ～ 2,000	200 ～ 700	収穫14日前まで			
おうとう				収穫30日前まで			
あずき			収穫 7 日前まで				
花き類 ・観葉植物 (カーネーション、 きくを除く)		2,000	150 ～ 300	発生初期			
カーネーション							1,000 ～ 2,000
きく		1,000					
やなぎ							ハダニ類
ほおずき		チャノホコリダニ					
しきみ		サビダニ類					1,000

△ 効果・薬害などの注意

1. 使用前によく振ってから使用してください。
2. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
3. ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようについていねいに散布してください。
4. 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
5. ばらの新展開葉に薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
6. さつきに薬害を生じることがあるので、薬剤がかからないように注意してください。
7. カラー、花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
8. 散布量は対象作物の生育段階・栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
9. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
10. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
11. 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意

12. 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
13. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
14. 皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
15. 散布液調製時及び散布の際は、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔等を石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
16. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
17. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
18. 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないように注意してください。

水産動植物への影響：水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう、適切に処理してください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、カギをかけて保管してください。盗難・紛失の際は、警察に届け出てください。

○使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空ビンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

●日曹ピラニカEWの上手な使い方

- ①一般にハウスなどの施設栽培メロンに使用する場合、特にネット系メロンでは、交配2～3日前から交配20日後までの幼果の時期には、薬害を生じるおそれがあるので、この時期の使用はさけてください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。